



## **RESIDÊNCIA MÉDICA/2018 - ENDOSCOPIA**

(Edital DRH/CRS nº 15/2017, de 24 de novembro de 2017).

*Clínica Médica e Cirurgia Geral*

**NOME:** \_\_\_\_\_

**LOCAL DE PROVA:** \_\_\_\_\_ **SALA:** \_\_\_\_\_

**DATA: 13/01/2018**

### **ORIENTAÇÕES AOS CANDIDATOS:**

1. Prova sem consulta.
2. Abra este caderno de prova somente quando autorizado.
3. Esta prova contém 40 (quarenta) questões, valendo 2,25 (dois vírgula vinte e cinco) pontos cada e valor total de 90 (noventa) pontos.
4. Para cada questão existe somente uma resposta correta.
5. Responda as questões e marque a opção desejada na folha de respostas, usando caneta (tinta azul ou preta).
6. Não será admitido nenhum tipo de rasura na folha de respostas. As questões rasuradas ou em branco ou com dupla marcação serão consideradas nulas para o candidato.
7. O tempo máximo permitido para a realização da prova objetiva será de 180 (cento e oitenta) minutos incluindo o preenchimento da folha de respostas.
8. É proibido o uso de máquinas calculadoras, telefones celulares ou outros similares e o porte de arma de fogo.
9. Iniciadas as provas, os candidatos somente poderão deixar a sala, e a esta retornar, exclusivamente para uso de sanitários ou bebedouros, e, ainda assim, somente no intervalo de tempo abrangido dentro da segunda hora de realização da prova, ou seja, das 09h31min às 10h30min, e devidamente acompanhados por fiscal do processo seletivo.
10. Ao final da prova, entregue ao aplicador a folha de respostas da prova objetiva e caderno de prova, devidamente preenchidos, assinados e conferidos.

## CLÍNICA MÉDICA

**1ª QUESTÃO** - Com relação à tuberculose intestinal marque a alternativa **CORRETA**:

- A. ( ) Acomete preferencialmente o duodeno e jejuno e, raramente o íleo terminal.
- B. ( ) A tuberculose intestinal primária ocorre pela colonização dos linfonodos mesentéricos durante a fase bacterêmica da tuberculose pulmonar.
- C. ( ) A coexistência de doença pulmonar ativa em pacientes com envolvimento gastrointestinal é muito rara.
- D. ( ) O procedimento de escolha para a confirmação do diagnóstico de tuberculose intestinal é o enema opaco.

**2ª QUESTÃO** - É um fator de risco para doença diverticular dos cólons:

- A. ( ) Baixo consumo de carne vermelha.
- B. ( ) Dieta rica em fibras.
- C. ( ) Síndrome de Marfan.
- D. ( ) Uso abusivo de diuréticos.

**3ª QUESTÃO** - Com relação à colite isquêmica, é **CORRETO** afirmar:

- A. ( ) Tem sido descrita com maior frequência em pacientes jovens, nestes casos pode ser secundária a vasculites, coagulopatias e esforço excessivo, por exemplo, a participação em maratonas (corridas de longa distância).
- B. ( ) A colonoscopia está sempre indicada para o diagnóstico.
- C. ( ) Nunca devem ser realizadas biópsias nas áreas acometidas identificadas à colonoscopia, pelo risco de perfuração.
- D. ( ) O tratamento é sempre cirúrgico.

**4ª QUESTÃO** - Com relação à Pancreatite autoimune, marque a alternativa **CORRETA**:

- A. ( ) Raramente se associa à insuficiência endócrina e exócrina do pâncreas.
- B. ( ) O tratamento baseia-se no uso oral de salicilatos.
- C. ( ) Nunca está indicada a ecoendoscopia associada à punção aspirativa com agulha fina para o seu diagnóstico.
- D. ( ) A sua forma de apresentação clínica mais característica é a icterícia indolor em decorrência da obstrução da via biliar principal em sua porção intrapancreática, pelo processo inflamatório periductal.

**5ª QUESTÃO** - Na disfunção do esfíncter de Oddi, marque a alternativa **CORRETA**:

- A. ( ) A presença de anormalidades no esfíncter de Oddi não é frequente em portadores de pancreatite crônica.
- B. ( ) A ecoendoscopia com estímulo com secretina é um teste invasivo que não é útil no diagnóstico desta patologia.
- C. ( ) A dor geralmente episódica, de tipo biliar, no quadrante superior direito ou epigástrico é o sintoma principal.
- D. ( ) Frequentemente, os pacientes apresentam icterícia e febre associadas.

**6ª QUESTÃO** - Com relação às hemorragias digestivas, marque a alternativa **CORRETA**:

- A. ( ) A endoscopia digestiva é o exame inicial e deve ser realizado o mais precocemente possível, antes mesmo da compensação do quadro hemodinâmico do paciente.
- B. ( ) Na hemorragia digestiva alta, a proteção das vias aéreas é importante para evitar a aspiração do sangue vomitado ou regurgitado, o que está associado à significativa morbimortalidade.
- C. ( ) Níveis sanguíneos baixos de ureia à admissão em paciente com função renal anteriormente normal pode ser uma evidência de sangramento grave.
- D. ( ) O tratamento definitivo de uma lesão hemorrágica é sempre endoscópico.

**7ª QUESTÃO** - Sobre a constipação intestinal marque a alternativa **CORRETA**:

- A. ( ) A retocele sempre está associada à constipação intestinal.
- B. ( ) Pacientes em uso de analgésicos opióides raramente apresentam constipação intestinal.
- C. ( ) A presença de menos de cinco evacuações por semana é um dos critérios diagnósticos da constipação intestinal.
- D. ( ) Durante a gravidez, a constipação intestinal pode estar relacionada ao aumento do nível de progesterona.

**8ª QUESTÃO** - Com relação às úlceras esofágicas, marque a alternativa **CORRETA**:

- A. ( ) Podem se apresentar com sangramento e fístulas com estruturas mediastinais.
- B. ( ) As úlceras esofágicas profundas são frequentes na doença de refluxo gastroesofágico.
- C. ( ) Sempre causam sintomas como disfagia, odinofagia e pirose.
- D. ( ) São definidas como áreas de solução de continuidade do epitélio que não atingem a camada submucosa.

**9ª QUESTÃO** - Marque a alternativa **CORRETA**. Em um paciente com anemia hemolítica espera-se parâmetros séricos diminuídos de:

- A. ( ) Desidrogenase láctica.
- B. ( ) Haptoglobina.
- C. ( ) Bilirrubina indireta.
- D. ( ) Reticulócitos.

**10ª QUESTÃO** - Marque a alternativa **CORRETA**. Qual dos agentes infecciosos abaixo não se relaciona à neoplasia maligna linfóide:

- A. ( ) JC vírus.
- B. ( ) Epstein-Barr vírus.
- C. ( ) HIV.
- D. ( ) H. pylori.

**11ª QUESTÃO** - Marque a alternativa **CORRETA** que contém uma ação do hormônio gastrointestinal Leptina:

- A. ( ) Estimular a produção de ácido gástrico.
- B. ( ) Causar a contração da vesícula biliar.
- C. ( ) Estimular o peristaltismo.
- D. ( ) Reduzir a ingestão alimentar.

**12ª QUESTÃO** - Marque a alternativa **CORRETA** que contém uma das características da Síndrome de Prader-Willi:

- A. ( ) Baixos níveis de Grelina circulantes mesmo durante jejum prolongado.
- B. ( ) Hipergastrinemia.
- C. ( ) Altos níveis de Grelina circulantes que não diminuem após uma refeição.
- D. ( ) Anorexia.

**13ª QUESTÃO** - Marque a alternativa **CORRETA** que contém a doença que está associada a deficiência de Niacina:

- A. ( ) Beriberi.
- B. ( ) Escorbuto.
- C. ( ) Pelagra.
- D. ( ) Raquitismo.

**14ª QUESTÃO** - Marque a alternativa **CORRETA** que está associada à deficiência de Selênio:

- A. ( ) Síndrome de Keshan.
- B. ( ) Hiperglicemia.
- C. ( ) Hipoglicemia.
- D. ( ) Hipertricose

**15ª QUESTÃO** - Marque a alternativa **CORRETA** que contém uma característica da Esofagite Eosinofílica:

- A. ( ) Não responde a dilatação endoscópica nas formas estenosantes.
- B. ( ) Presença de mais de 15 eosinófilos por campo de maior aumento na biópsia esofagiana.
- C. ( ) O tratamento ideal é feito com bloqueadores H2.
- D. ( ) A impactação alimentar e a disfagia nunca acontecem.

**16ª QUESTÃO** - A Tuberculose intestinal localiza-se mais comumente no:

- A. ( ) Jejuno.
- B. ( ) Duodeno.
- C. ( ) Reto.
- D. ( ) Íleo terminal.

**17ª QUESTÃO** - Não faz parte da “Tríade Fissurária” na fissura anal:

- A. ( ) Hemorroidas internas.
- B. ( ) Fissura anal.
- C. ( ) Plicoma sentinela.
- D. ( ) Papila hipertrófica.

**18ª QUESTÃO** - É conhecida como uma das “características essenciais” da doença de Parkinson:

- A. ( ) Fásces em máscara (hipomínia).
- B. ( ) Bradicinesia.
- C. ( ) Demência.
- D. ( ) Micrografia.

**19ª QUESTÃO:** Em relação ao hiperparatireoidismo, marque a alternativa **INCORRETA**:

- A. ( ) Os tumores das paratireoides apresentam-se mais frequentemente como adenomas isolados, sem outra endocrinopatia.
- B. ( ) O carcinoma de paratireoides não costuma ser agressivo, e a sobrevida a longo prazo, sem recidiva é comum, se na ocasião da cirurgia inicial, toda a glândula foi removida sem ruptura da cápsula.
- C. ( ) A manifestação óssea distintiva do hiperparatireoidismo é a osteíte fibrosa cística.
- D. ( ) Cerca de 80% dos pacientes com hiperparatireoidismo são sintomáticos, com manifestações que envolvem principalmente o aparelho digestivo e sistema músculo esquelético.

**20ª QUESTÃO** - Marque a alternativa **CORRETA** em relação às lesões renais agudas:

- A. ( ) Quando associada à rabdomiólise observa-se exame de urina positivo para grupo heme com muitas hemácias.
- B. ( ) Quando associada à hemólise, observa-se LDH baixa e haptoglobina alta.
- C. ( ) A obstrução do colo vesical é uma causa rara de lesão renal aguda pós-renal.
- D. ( ) As causas mais comuns de lesão renal aguda intrínseca são sepse, isquemia e nefrotoxinas endógenas e exógenas.

## CIRURGIA GERAL

**21ª QUESTÃO** - Em relação aos exames laboratoriais na avaliação de um quadro de abdome agudo, assinale a alternativa **CORRETA**:

- A. ( ) A alta especificidade da proteína C reativa muitas vezes faz com que este teste mereça extrema consideração, mesmo à revelia de dados clínicos.
- B. ( ) A presença de piúria no exame de urina rotina permite fazer o diagnóstico diferencial entre ureterolitíase e apendicite pélvica.
- C. ( ) Em pacientes com apendicite aguda o leucograma pode ser normal em até 50% dos casos.
- D. ( ) A cetoacidose diabética, confirmada clínica e laboratorialmente, jamais origina dor abdominal aguda.

**22ª QUESTÃO** - Sobre os exames radiológicos convencionais utilizados na avaliação de um quadro abdominal agudo, assinale a alternativa **CORRETA**:

- A. ( ) Pequeno acúmulo gasoso no espaço peritoneal é melhor demonstrado em radiografias do tórax nas incidências ântero-posterior e látero-lateral com o paciente em ortostatismo, do que em radiografias do abdome obtidas nesta posição.
- B. ( ) A presença de litíase apendicular à radiografia simples do abdome não é o achado isolado mais importante no diagnóstico da apendicite aguda.
- C. ( ) No megacólon tóxico, a radiografia simples do abdome é, na maioria dos casos, insuficiente para o diagnóstico, estando indicado o enema opaco.
- D. ( ) O sinal da dupla-bolha, evidenciado à radiografia simples do abdome em ortostatismo é indicativo de obstrução gástrica.

**23ª QUESTÃO** - Em relação aos objetivos da avaliação clínica pré-operatória, assinale a alternativa **CORRETA**:

- A. ( ) Diagnosticar outras afecções de tratamento cirúrgico.
- B. ( ) Conhecer a função básica pré-operatória do paciente, ainda que esta não sirva de modelo para futuras comparações.
- C. ( ) Não se presta a avaliar condições que aumentem o risco anestésico, uma vez que esta avaliação deve ser feita exclusivamente pelo anestesiológico.
- D. ( ) Sabe-se que menos de 50% dos pacientes cirúrgicos apresentam comorbidades, sendo as doenças infecto-parasitárias as mais comuns.

**24ª QUESTÃO** - Sobre as técnicas de avaliação do estado nutricional em pacientes cirúrgicos, marque a alternativa **CORRETA**:

- A. ( ) A avaliação do estado nutricional em pacientes hospitalizados não precisa ser rotina.
- B. ( ) Existem diversas técnicas para se avaliar o estado nutricional, porém nenhuma é considerada padrão ouro, razão pela qual se indica a utilização de mais de uma.
- C. ( ) O valor da albumina sérica é fundamental para o diagnóstico do estado nutricional, mas não se constitui em indicador prognóstico para o desenvolvimento de complicações e mortalidade.
- D. ( ) A análise de impedância bioelétrica é uma técnica fácil, porém dispendiosa e dolorosa.

**25ª QUESTÃO** - Em relação à classificação de uma ferida quanto à sua profundidade, assinale a alternativa **CORRETA**:

- A. ( ) Ferida com perda parcial: destruição da epiderme, derme e tecido celular subcutâneo.
- B. ( ) A cicatriz decorrente de feridas com perda parcial é bastante evidente e perceptível.
- C. ( ) Ferida superficial: a lesão é limitada à epiderme.
- D. ( ) Ferida com perda total: obrigatoriamente atinge ossos.

**26ª QUESTÃO** - Sobre a avaliação laboratorial da coagulação do paciente cirúrgico, assinale a alternativa **CORRETA**:

- A. ( ) O tempo de tromboplastina parcial ativado se relaciona exclusivamente com fatores da via comum.
- B. ( ) O tempo de trombina não é capaz de avaliar a função do fibrinogênio.
- C. ( ) O fator VII pertence à via intrínseca.
- D. ( ) O tempo de protrombina se relaciona com os fatores da via extrínseca e comum.

**27ª QUESTÃO** - Muitas órteses e próteses são utilizadas em procedimentos cirúrgicos atualmente. Assinale a alternativa **CORRETA** que cita um exemplo de órtese:

- A. ( ) Telas de polipropileno.
- B. ( ) Marcapassos.
- C. ( ) Lentes intra-oculares.
- D. ( ) Válvulas cardíacas.

**28ª QUESTÃO** - Em relação às orientações quanto ao tempo mínimo de jejum pré-operatório, assinale a alternativa **CORRETA**:

- A. ( ) Leite humano – 6 horas.
- B. ( ) Bebida rica em carboidratos – 2 horas.
- C. ( ) Leite de fórmulas infantis – 8 horas.
- D. ( ) Alimentos sólidos – 12 horas.

**29ª QUESTÃO** - Considerando-se o diagnóstico ultrassonográfico da apendicite aguda, marque a alternativa **CORRETA**:

- A. ( ) Calibre apendicular a partir de 3 mm é um sinal ecográfico fundamental no diagnóstico da afecção.
- B. ( ) Espessamento da parede a partir de 6 mm é sinal ecográfico patognomônico.
- C. ( ) Após a perfuração, o apêndice habitualmente é melhor visibilizado, em face da presença de líquido adjacente.
- D. ( ) A não compressibilidade do apêndice cecal durante a compressão dirigida constitui o principal sinal ultrassonográfico.

**30ª QUESTÃO** - Em relação aos critérios tomográficos de Balthazar para graduar a pancreatite aguda, assinale a alternativa **CORRETA**:

- A. ( ) Grau “C” – pâncreas aumentado de tamanho – óbito: 0%.
- B. ( ) Somente no grau “A” a formação de abscesso ocorre em menos de 2% dos casos.
- C. ( ) Nos pacientes classificados como grau “E” a formação de abscessos é mais frequente, porém a incidência raramente chega aos 30 %.
- D. ( ) A mortalidade dos pacientes que evoluem com necrose ultrapassa os 50%.

**31ª QUESTÃO** - Sobre a doença diverticular dos cólons, marque a alternativa **CORRETA**:

- A. ( ) Os divertículos congênitos normalmente são múltiplos e classificados como falsos divertículos.
- B. ( ) A colonoscopia é método importante no diagnóstico e avaliação do prognóstico da diverticulite aguda.
- C. ( ) A forma hipotônica é a mais frequente.
- D. ( ) O enema opaco atualmente não apresenta nenhuma indicação na avaliação da doença diverticular não complicada, em virtude de métodos diagnósticos mais modernos como a tomografia computadorizada.

**32ª QUESTÃO** - Considerando-se os padrões dos testes de função hepática em afecções que apresentam diagnóstico diferencial com a colangite aguda, assinale a alternativa **CORRETA**:

- A. ( ) ALT e AST normalmente estão moderada ou acentuadamente elevadas na cirrose hepática.
- B. ( ) Na hepatite aguda, as bilirrubinas total e direta habitualmente estão aumentadas.
- C. ( ) Na colangite aguda, com obstrução biliar, não ocorrem alterações no tempo de protrombina.
- D. ( ) Na hepatite aguda não há razão para que ocorra queda nos níveis de albumina sérica.



**33ª QUESTÃO** - Em relação à síndrome de Boerhaave, marque a alternativa **CORRETA**:

- A. ( ) A tríade clássica do diagnóstico da síndrome é verificada em mais de 90% dos casos.
- B. ( ) O diagnóstico diferencial é frequentemente fácil.
- C. ( ) O chamado “período de ouro” para o sucesso do tratamento compreende as primeiras 6 horas.
- D. ( ) Aproximadamente 90% das rupturas espontâneas ocorrem na parede lateral esquerda do esôfago supradiaphragmático.

**34ª QUESTÃO** - Considerando-se a gravidez ectópica, marque a alternativa **CORRETA**:

- A. ( ) Os métodos contraceptivos aumentam a incidência global de gravidez ectópica.
- B. ( ) Na gravidez ectópica rota, o tratamento clínico deve ser considerado.
- C. ( ) A salpingotomia é a primeira escolha no tratamento da gravidez ectópica rota.
- D. ( ) O tabagismo é um fator de risco para a gravidez ectópica.

**35ª QUESTÃO** - Sobre a ruptura espontânea do fígado, marque a alternativa **CORRETA**:

- A. ( ) A pré-eclampsia não aumenta a possibilidade de ruptura hepática espontânea.
- B. ( ) A gravidez é a condição mais frequentemente relacionada à ruptura hepática espontânea.
- C. ( ) A ruptura é uma complicação rara do abscesso amebiano.
- D. ( ) O hepatocarcinoma apresenta índice relativamente baixo de ruptura espontânea.

**36ª QUESTÃO** - Em relação aos aneurismas da aorta abdominal e de seus ramos viscerais, assinale a alternativa **CORRETA**:

- A. ( ) Os principais fatores de risco para o desenvolvimento dos aneurismas aórticos são a síndrome de Marfan e a síndrome de Ehler-Danlos tipo IV.
- B. ( ) Os pacientes que apresentam aneurismas aórticos com diâmetro máximo de 8 cm têm risco de ruptura anual de 10%.
- C. ( ) A aorta infra-renal é a sede mais frequente de dilatações aneurismáticas no corpo humano.
- D. ( ) Os aneurismas da artéria esplênica são os mais prevalentes na cavidade abdominal.

**37ª QUESTÃO** - Considerando-se a colite isquêmica, marque a alternativa **CORRETA**:

- A. ( ) A colonoscopia é o exame de escolha para o diagnóstico.
- B. ( ) Os achados endoscópicos são bastante específicos.
- C. ( ) O tratamento conservador não gera melhora.
- D. ( ) Colite crônica segmentar, com ulcerações, raramente constitui-se em indicação de tratamento cirúrgico.

**38ª Questão** - Em relação à síndrome de Ogilvie, assinale a alternativa **CORRETA**:

- A. ( ) A constipação é o achado mais comumente observado.
- B. ( ) A radiografia simples do abdome é o método mais útil ao diagnóstico.
- C. ( ) A colonoscopia descompressiva deve ser realizada antes de qualquer outra alternativa terapêutica.
- D. ( ) O tratamento conservador raramente resolve a síndrome de Ogilvie.

**39ª QUESTÃO** - Sobre o abdome agudo na paciente gestante, assinale a alternativa **CORRETA**:

- A. ( ) A via laparoscópica deve ser evitada no tratamento da apendicite aguda na paciente grávida, em virtude do pneumoperitônio.
- B. ( ) O tratamento clínico da colecistite aguda deve ser evitado no primeiro trimestre da gestação.
- C. ( ) A apendicite aguda é a principal complicação abdominal extra-uterina durante a gravidez.
- D. ( ) Em virtude do crescimento uterino, o volvo intestinal é a causa mais frequente de abdome agudo obstrutivo em pacientes gestantes.

**40ª QUESTÃO** - Em relação às cirurgias realizadas nos pacientes obesos mórbidos, marque a alternativa **CORRETA**:

- A. ( ) A perda de apenas 5% a 10% do peso corporal pode contribuir significativamente para o controle das comorbidades existentes.
- B. ( ) A síndrome de Pickwick representa o estágio inicial da hipoventilação do obeso.
- C. ( ) A polissonografia é dispensável no diagnóstico da síndrome da apnéia obstrutiva do sono, na presença de forte suspeita clínica.
- D. ( ) A via laparoscópica ainda mostra inferioridade em relação à laparotômica, em vários aspectos.

Corte aqui

**RASCUNHO – GABARITO DO CANDIDATO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	
<b>21</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>25</b>	<b>26</b>	<b>27</b>	<b>28</b>	<b>29</b>	<b>30</b>	<b>31</b>	<b>32</b>	<b>33</b>	<b>34</b>	<b>35</b>	<b>36</b>	<b>37</b>	<b>38</b>	<b>39</b>	<b>40</b>	