

GABARITO - QOS/2009
ENFERMEIRO

1ª QUESTÃO	A	B	C	D
2ª QUESTÃO	A	B	C	D
3ª QUESTÃO	A	B	C	D
4ª QUESTÃO	A	B	C	D
5ª QUESTÃO	A	B	C	D
6ª QUESTÃO	A	B	C	D
7ª QUESTÃO	A	B	C	D
8ª QUESTÃO	A	B	C	D
9ª QUESTÃO	A	B	C	D
10ª QUESTÃO	A	B	C	D
11ª QUESTÃO	A	B	C	D
12ª QUESTÃO	A	B	C	D
13ª QUESTÃO	A	B	C	D
14ª QUESTÃO	A	B	C	D
15ª QUESTÃO	A	B	C	D
16ª QUESTÃO	A	B	C	D
17ª QUESTÃO	A	B	C	D
18ª QUESTÃO	A	B	C	D
19ª QUESTÃO	A	B	C	D
20ª QUESTÃO	A	B	C	D

21ª QUESTÃO	A	B	C	D
22ª QUESTÃO	A	B	C	D
23ª QUESTÃO	A	B	C	D
24ª QUESTÃO	A	B	C	D
25ª QUESTÃO	A	B	C	D
26ª QUESTÃO	A	B	C	D
27ª QUESTÃO	A	B	C	D
28ª QUESTÃO	A	B	C	D
29ª QUESTÃO	A	B	C	D
30ª QUESTÃO	A	B	C	D
31ª QUESTÃO	A	B	C	D
32ª QUESTÃO	A	B	C	D
33ª QUESTÃO	A	B	C	D
34ª QUESTÃO	A	B	C	D
35ª QUESTÃO	A	B	C	D
36ª QUESTÃO	A	B	C	D
37ª QUESTÃO	A	B	C	D
38ª QUESTÃO	A	B	C	D
39ª QUESTÃO	A	B	C	D
40ª QUESTÃO	A	B	C	D

ENFERMEIRO

**POLÍCIA
MILITAR**
DE MINAS GERAIS
Nossa profissão, sua vida.

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO



**PROVA DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO
DE 2º TENENTE DO QUADRO DE OFICIAIS DE SAÚDE (QOS) DA
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS.**

QOS / 2009

(Edital DRH/CRS, nº 09/2008, de 29 de maio de 2008)

LÍNGUA PORTUGUESA, DIREITOS HUMANOS E CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS.

NOME: _____

LOCAL DE PROVA: _____ **SALA:** _____

INSTRUÇÕES AOS CANDIDATOS:

1. Abra este caderno de prova somente quando autorizado.
2. Esta prova contém 40 (quarenta) questões valendo 2,5 (dois vírgula cinco) pontos cada e valor total de 100 (cem) pontos.
3. O tempo máximo permitido para a realização da prova objetiva será de 3 (três) horas incluindo o preenchimento da folha de respostas.
4. Responda as questões e marque a opção desejada na folha de respostas, usando caneta (tinta azul ou preta).
5. Para cada questão existe somente uma resposta.
6. Prova sem consulta.
7. Não será admitido nenhum tipo de rasura na folha de respostas. As questões rasuradas ou em branco ou com dupla marcação serão consideradas nulas para o candidato.
8. É proibido o uso de máquinas calculadoras, telefones celulares ou outros similares.
9. Iniciadas as provas, os candidatos somente poderão deixar a sala, e a esta retornar, exclusivamente para uso de sanitários ou bebedouros, e ainda assim somente no intervalo de tempo abrangido dentro da segunda hora de realização das provas, ou seja, das 09:30 às 10:30 hs, e devidamente acompanhados por fiscal do concurso.
10. Ao final da prova, entregue ao aplicador a folha de respostas, devidamente preenchida, assinada e conferida.

PROVA DO CONCURSO PÚBLICO P/ PROVIMENTO DE CARGO DE 2º TEN DO
QUADRO DE OFICIAIS DE SAÚDE (QOS) DA PMMG – 2009 (ENFERMEIRO)

LÍNGUA PORTUGUESA

Ação sem insígnia

Rosane Pavam (10/04/2008)

“O teste para uma inteligência de primeira categoria”, disse o escritor americano F. Scott Fitzgerald, “é a capacidade de ter em mente duas idéias opostas ao mesmo tempo, e ainda continuar em condições de funcionar”. Este parece ser um dito para todos os americanos, eles e nós. A capacidade de absorver esta simultaneidade serve a qualquer um, é mesmo necessária, especialmente se desejamos compreender uma ironia, um sarcasmo, uma complexidade. Um grego já sabia disto antes de todos.

E, no entanto, é quase certo que, ainda hoje, nós nos vejamos em dificuldades, como opinião pública, para agir nas entrelinhas e exercer a sutileza no largo caminho entre um não e um sim. Que enorme diferença haveria entre republicanos e democratas, lulistas e serristas, milionários e perdedores, obamas e clintons? As compreensões deveriam ser dinâmicas como o monjolo cuja água que entra se renova naquela que sai – no fundo, é uma água só.

Especialmente quando nos pomos a escrever para a imprensa, experimentamos muitas e cotidianas incompreensões. O risco de ser sutil vem junto com aquele de exercer a profissão. É um risco semelhante metaforicamente àquele de que foi vítima Ayrton Senna na Tamburello: claro está que o piloto não desconhecia a possibilidade muito grande de se espatifar numa curva, mas, além de todos, ele conhecia seu valor de mercado e considerava tal chance como inevitável em cada corrida. Jamais fugiu de correr do jeito que lhe pareceu melhor. Mas, bem, opa, não se pode mexer em um ícone como Senna, nem por alegoria, nem por livre-pensar, nem, muito menos, por humor! Então me desculpem?

Mas é que eu temo que a cada dia nos aproximemos de um jeito Bope de ser, jocoso, emburrecido, prepotente, com arma em punho, quando o homem tem pensamentos a sacar diante de várias situações tidas por extremas. Nós temos preferido nos tornar contundentes como a polícia, sem, contudo, exibir a consistência exigida para a ação de um policial. A cada dia, nós parecemos incapazes de expressar os sentimentos em forma de prisma, absorvendo e refletindo uma luz a partir de muitos lados.

Podemos divagar solitariamente sobre quem teria matado a pobre menina Isabela, por exemplo, o pai, a madrasta ou o pedreiro, neste enredo de intimidade macabra que se anuncia a qualquer espectador de tevê ou leitor de jornal. Mas de que nos serve jogar a primeira pedra em algum suspeito não julgado, diante da delegacia pela qual ele passa, munidos de nossos pequenos filhos ao colo, encapotados e desentendidos numa noite fria? Vi esta cena em um jornal sensacionalista de televisão e senti o frio da rua invadir meu sofá. Quem conhece ao certo o autor da atrocidade contra a menina, tão certo desta autoria que pode prejudicá-la?

PROVA DO CONCURSO PÚBLICO P/ PROVIMENTO DE CARGO DE 2º TEN DO
QUADRO DE OFICIAIS DE SAÚDE (QOS) DA PMMG – 2009 (ENFERMEIRO)

Somos muitos, somos vários, e tal atitude de linchamento deve dizer respeito à intensa agitação psicológica de cada um, a seu medo de identificar-se com a monstruosidade, a sua necessidade de gritar, para afastá-la. Ninguém pode impedir uma pessoa justamente consternada (quanto mais duas ou três, juntas, contaminadas pelo repúdio), que se manifeste publicamente. Mas este é um assunto sobre o qual podemos refletir antes de chegar à ação, ou pelo menos depois de tê-la alcançado.

Falei sobre Isabela, mas não há só ela neste vasto, triste mundo. Somos policiais de muitos modos, todos os dias, diante das pequenas atitudes alheias que nos incomodam ou que se sobressaem a nós. Não há nada ruim em ser policial, por favor, especialmente um policial real, que aja para coibir um crime! Mas existe algo de exasperante em nossa eterna beligerância no papel de juízes dos dias comuns, como se nos víssemos no direito de agir contra os outros sem portar a devida insígnia.

Nós nos julgamos em posição de avaliar, por exemplo, um artigo de David Mamet reproduzido no caderno Mais! da “Folha de S. Paulo” do dia 6 de abril. O diretor e dramaturgo Mamet, dizem os jornalistas, guinou à direita. Mas o artigo não expressa isto, parece-me. Diante deste artista, sempre foi possível ler as posições clássicas de um conservador. Um americano vê comumente dois mundos opostos, de republicanos ou democratas. Contudo, quem estaria mais à direita ou à esquerda entre os dois? Mamet reconhece essa diferença mínima, e agora nos diz o óbvio: que John Kennedy cometeu um pecado eleitoral tanto quanto George W. Bush. Há quanto tempo ele conhece esta verdade, não é? Faltou anotar, em Kennedy, a porção belicista que se reconhece facilmente em Bush.

Em seu artigo, Mamet, que faz filmes em torno de estabelecer erros (“O Assalto”) e culpas (“Cadete Winslow”), é um pensador liberal em busca do acerto e do aprimoramento de um estilo de vida. Ele não pode aceitar que sejam todos menos americanos do que são. Então, quando a América parece próxima do perigo do enxovalho e da destituição de sua primazia no cenário econômico, político e de idéias, ele promove uma grita, que deve ser tida por natural.

Que mal há em expor com sinceridade uma posição já conhecida? É o mesmo que fez Jason Reitman, cineasta de menor envergadura intelectual, em “Juno” e “Obrigado por Fumar”. Alguém tem de devolver a América a seu lugar: que sejam, estas pessoas, os intelectuais. Reitman e Mamet, artistas inteligentes, talvez se horrorizem diante da possibilidade de se verem administrados por um sistema chinês. Ninguém poderá condená-los no terreno da palavra. Mas, como observadores, sejamos sutis ao analisar suas posições.

**PROVA DO CONCURSO PÚBLICO P/ PROVIMENTO DE CARGO DE 2º TEN DO
QUADRO DE OFICIAIS DE SAÚDE (QOS) DA PMMG – 2009 (ENFERMEIRO)**

INTERPRETAÇÃO DE TEXTO

1ª QUESTÃO – Com relação ao 7º parágrafo do texto, pode-se afirmar que:

- A. () A autora menoscaba o trabalho do policial real.
- B. () **Ainda que as pessoas se julguem, o papel da polícia é eminente.**
- C. () As pessoas comuns têm o direito de agir contra os outros, mesmo não sendo policiais.
- D. () O fato de as pessoas serem comparadas a “juízes dos dias comuns” torna improficuo o trabalho policial investigativo.

2ª QUESTÃO – Leia a passagem abaixo:

“Que enorme diferença haveria entre republicanos e democratas, lulistas e serristas, milionários e perdedores, obamas e clintons?”

Pode-se dizer que a passagem acima foi construída através de um (a):

- A. () **antagonismo.**
- B. () parceria.
- C. () coalizão.
- D. () conivência.

3ª QUESTÃO – De acordo com o 3º parágrafo do texto, é **CORRETO** afirmar sobre Ayrton Senna que:

- A. () O piloto pode ser considerado néscio, quanto à possibilidade de sofrer um acidente.
- B. () O piloto passou incólume pela Tamburello.
- C. () **O piloto discernia sobre os percalços da profissão.**
- D. () O piloto considerava a chance de se acidentar como altiva.

4ª QUESTÃO – Com relação às idéias contidas no 5º parágrafo do texto, marque a alternativa **CORRETA**:

- A. () É de conhecimento de todos os brasileiros o homicida da menina Isabela.
- B. () **Não há por que julgar um suspeito que não foi sentenciado.**
- C. () O caso apresentado é um desconchavo da opinião pública.
- D. () A ignorância da população promoverá a absolvição do culpado.

GRAMÁTICA

5ª QUESTÃO – Eles ____ providenciaram as insígnias, que enviaram ____ às procurações, como instrumentos ____ para os fins colimados.

- A. () mesmo – anexos – bastante.
- B. () mesmos – anexo – bastantes.
- C. () mesmos – anexas – bastante.
- D. () **mesmos – anexas – bastantes.**

**PROVA DO CONCURSO PÚBLICO P/ PROVIMENTO DE CARGO DE 2º TEN DO
QUADRO DE OFICIAIS DE SAÚDE (QOS) DA PMMG – 2009 (ENFERMEIRO)**

6ª QUESTÃO– Examine as frases:

1. Quero saber _____ você não entendeu a ironia.
2. Conte-me _____ essa sutileza.
3. As incompreensões _____ eu passei foram muitas.
4. Você está com um jeito Bope de ser. Diga-me _____.
5. Deixem-me ir agora, _____ estou agitado.
6. Tudo na vida tem um _____.

A série que completa corretamente – pela ordem – as lacunas acima é:

- A. () porque/ por que/ por que/ por que/ por que/ por quê.
B. () por que/ porque/ por que/ por que/ por que/ porquê.
C. () porque/ porque/ por que/ porquê/ porque/ por quê.
D. () **por que/ por que/ por que/ por quê/ porque/ porquê.**

7ª QUESTÃO– A pontuação **CORRETA** do período abaixo encontra-se na alternativa:

“No que tange à ironia _____ podemos encará-la sob dois aspectos interessantes _____ é vício, acostumados que estamos a viver com ela _____ é álibi, capaz de tornar justificáveis muitos de nossos erros.”

- A. () **vírgula / dois pontos / ponto-e-vírgula.**
B. () vírgula / vírgula / vírgula.
C. () vírgula / ponto-e-vírgula / vírgula.
D. () vírgula / dois pontos / vírgula.

8ª QUESTÃO– Na frase: “*Temos necessidade de leis*”, o termo destacado exerce, sintaticamente, a função de:

- A. () objeto indireto.
B. () objeto direto.
C. () **complemento nominal.**
D. () adjunto adnominal do sujeito.

9ª QUESTÃO– Observe o seguinte grupo de orações:

1. *É necessário que sejam sutis.*
2. *A verdade é que ele conhecia o seu valor.*
3. *Só dizia uma coisa: que venceria os obstáculos.*

Temos orações subordinadas, **RESPECTIVAMENTE**:

- A. () **substantiva subjetiva, substantiva predicativa, substantiva apositiva.**
B. () substantiva objetiva direta, substantiva subjetiva, substantiva conformativa.
C. () adverbial condicional, adverbial conformativa, adverbial final.
D. () adverbial consecutiva, adverbial concessiva, adverbial proporcional.

PROVA DO CONCURSO PÚBLICO P/ PROVIMENTO DE CARGO DE 2º TEN DO
QUADRO DE OFICIAIS DE SAÚDE (QOS) DA PMMG – 2009 (ENFERMEIRO)

DIREITOS HUMANOS

10ª QUESTÃO – De acordo com o Decreto nº 43.683, de 10 de dezembro de 2003, que regulamenta a Lei nº 14.170/02, são espécies de sanções impostas às pessoas jurídicas de Direito privado autoras de manifestações de discriminações, coações e atentados contra os direitos das pessoas em razão da sua orientação sexual.

- A. () Prestação de serviço em entidades estaduais, obrigação de participar de atividades educativas relacionadas ao tema, proibição de participação em concurso público.
- B. () **Multa, suspensão de funcionamento de estabelecimento, rescisão de contratos firmado com órgão ou entidade da administração Estadual.**
- C. () Obrigação de participação em atividades culturais, proibição de participação em concurso público, obrigação de proferir palestras educativas relacionadas com a lei.
- D. () Prestação de serviços em hospitais da rede estadual, prestação de serviços comunitários.

11ª QUESTÃO – De acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 10 de dezembro de 1948, é **CORRETO** afirmar que:

- A. () **Toda pessoa tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal.**
- B. () Ninguém será submetido à tortura, salvo nos casos de autoria de crime contra a segurança nacional.
- C. () Quando o país estiver em estado de sítio poderá ocorrer a detenção e a prisão arbitrária.
- D. () Toda pessoa tem direito a repouso e a lazer, inclusive a limitação razoável das horas de trabalho e férias anuais não remuneradas.

12ª QUESTÃO – De acordo com o artigo 14 da Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988, a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:

- A. () Eleição do Presidente da República, dos Governadores dos Estados e Prefeitos Municipais.
- B. () Aprovações de normas e regulamentos diversos pelo Congresso Nacional (Câmara dos Deputado e Senado Federal), Assembléias Legislativas dos Estados e Câmaras de Vereadores dos Municípios.
- C. () **Plebiscito, referendo e iniciativa popular.**
- D. () Eleições de Senadores, Deputados federais e Estaduais, como também dos Vereadores Municipais.

PROVA DO CONCURSO PÚBLICO P/ PROVIMENTO DE CARGO DE 2º TEN DO
QUADRO DE OFICIAIS DE SAÚDE (QOS) DA PMMG – 2009 (ENFERMEIRO)

13ª QUESTÃO – O artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988, elenca os direitos e os deveres individuais e coletivos afirmando que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade.

Com base na afirmação acima marque a única opção **CORRETA**.

- A. () O artigo 5º não reconhece a gratuidade do *habeas corpus* e do *habeas data*, e, na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania.
- B. () O artigo 5º reconhece a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem, assegurando o direito a indenização pelo dano moral ou material decorrente de sua violação.
- C. () O artigo 5º reconhece a gratuidade do Mandado de Segurança.
- D. () O artigo 5º reconhece a individualização da pena e a adoção, como pena possível de ser aplicada, o banimento e a perda de bens.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
ENFERMEIRO

14ª QUESTÃO – Considerando os cuidados de Enfermagem durante a mensuração da pressão arterial em crianças, marque a alternativa **CORRETA**:

- A. () Quando não se tem disponível manguito de tamanho apropriado para a idade do paciente, devemos optar pelo manguito de menor tamanho ou definir por um outro local para aferição.
- B. () Use manguito de tamanho menor no antebraço: coloque o manguito acima do punho e ausculte a artéria braquial.
- C. () Use manguito de tamanho maior na coxa: coloque o manguito acima do joelho e ausculte a artéria femoral.
- D. () Use manguito de tamanho maior na panturrilha: coloque o manguito acima dos maléolos e ausculte a artéria tibial posterior ou a pediosa dorsal.

PROVA DO CONCURSO PÚBLICO P/ PROVIMENTO DE CARGO DE 2º TEN DO
QUADRO DE OFICIAIS DE SAÚDE (QOS) DA PMMG – 2009 (ENFERMEIRO)

15ª QUESTÃO - De acordo com a fisiopatologia dos quadros convulsivos e cuidados destinados aos pacientes portadores dessas patologias, marque a alternativa **CORRETA**:

- A. () As crianças que usam fenobarbital e/ou fenitoína devem receber vitamina D e ácido fólico adequados pois a deficiência de ambos estão associadas ao uso desses antiepiléticos.
- B. () Por ser incompatível com diversas drogas, o diazepam, quando prescrito por via endovenosa, deve ser administrado diretamente na veia ou o mais distante possível do local de inserção do cateter venoso já instalado.
- C. () Durante uma crise convulsiva tônica-clônica, a criança não pode ser movimentada, devendo permanecer contida no leito e ter seus dentes e língua protegidos por um objeto sólido.
- D. () O estado epilético não se constitui uma emergência médica, devendo o paciente ser levado posteriormente ao serviço médico para acompanhamento e controle.

16ª QUESTÃO - De acordo com a Lei 7498 de 25/06/86, que dispõe sobre a Regulamentação do Exercício da Enfermagem e dá outras providências, marque a alternativa **CORRETA** :

- A. () A atuação das parteiras não está prevista em lei.
- B. () Ao enfermeiro cabe especialmente participar da programação da assistência de enfermagem.
- C. () Ao auxiliar de enfermagem cabe, especialmente, entre outras ações, observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas.
- D. () Ao Enfermeiro cabe privativamente a assistência de enfermagem à gestante, parturiente e puérpera.

17ª QUESTÃO - Considerando a fisiopatologia dos estados de “choque”, marque a alternativa **CORRETA**:

- A. () As soluções cristalóides são administradas em pequeno volume devido a rápida expansão do volume plasmático.
- B. () A seqüência fisiopatológica do choque hipovolêmico compreende: volume sanguíneo diminuído, retorno venoso diminuído, volume sistólico diminuído, débito cardíaco diminuído e perfusão tecidual diminuída.
- C. () Imunossupressão, desnutrição, hemorragia e diabetes insípido são fatores de risco para o choque cardiogênico.
- D. () A posição de trendelenburg plena é um posicionamento adequado ao paciente em choque por facilitar a respiração e auxiliar na redistribuição de líquidos.

PROVA DO CONCURSO PÚBLICO P/ PROVIMENTO DE CARGO DE 2º TEN DO
QUADRO DE OFICIAIS DE SAÚDE (QOS) DA PMMG – 2009 (ENFERMEIRO)

18ª QUESTÃO - Em relação às precauções padrão e tipos de isolamentos utilizados no controle e prevenção de doenças infecciosas, marque a alternativa **CORRETA**:

- A. () Pacientes com suspeita de sarampo podem permanecer em quartos coletivos até a confirmação diagnóstica da doença.
- B. () Isolamentos respiratórios exigem ar condicionado individualizados com programação de 2 trocas a cada hora.
- C. () A presença de pele íntegra dispensa o uso de luvas em procedimentos com risco de contato com sangue, secreções e excreções corporais.
- D. () Utilizar quarto privativo, sempre que possível, limitando o movimento do paciente para fora do quarto, é medida de precaução de contato.

19ª QUESTÃO - Sobre os agentes anestésicos marque a alternativa **CORRETA**:

- A. () Na “sedação consciente” o paciente deve ser continuamente monitorado para detecção precoce de arritmias e depressão respiratória.
- B. () A cefaléia pode acontecer após a anestesia epidural devido ao grande volume de droga anestésica infundida no espaço epidural.
- C. () A ação de um anestésico pode ser considerada “acabada” se um dos três sistemas (motor, sensorial e autonômico) não esteja mais sendo afetado pelo anestésico.
- D. () Os agentes anestésicos endovenosos estão indicados para crianças por terem como vantagens o fato de não serem explosivos, exigirem pouco equipamento e serem fáceis de administrar.

20ª QUESTÃO - São etapas constituintes do Plano de Cuidados:

- A. () Investigação, Identificação de problemas, Análise de dados, Implementação e Avaliação.
- B. () Resultados esperados, Problemas reais e potenciais, Intervenções específicas e Avaliação/Registro de Evolução.
- C. () Identificação de problemas, Diagnóstico de Enfermagem, Fatores de risco e Resultados esperados.
- D. () Diagnóstico de Enfermagem, Complicação potencial, Intervenções específicas e Prescrição de Enfermagem.

PROVA DO CONCURSO PÚBLICO P/ PROVIMENTO DE CARGO DE 2º TEN DO
QUADRO DE OFICIAIS DE SAÚDE (QOS) DA PMMG – 2009 (ENFERMEIRO)

21ª QUESTÃO - Considerando as etapas do Processo de Enfermagem, marque a alternativa **CORRETA**:

- A. () As intervenções de enfermagem são julgamentos críticos sobre as respostas do indivíduo, da família ou da comunidade aos processos de vida e problemas de saúde reais ou potenciais.
- B. () **O diagnóstico de enfermagem fornece a base para a seleção das intervenções de enfermagem, visando a obtenção de resultados pelos quais a Enfermeira é responsável.**
- C. () Os resultados esperados podem ser categorizados como independentes (prescritos pelo médico) e dependentes (prescritos pela enfermagem) .
- D. () O planejamento dos cuidados descreve o comportamento mensurável do cliente ou da família, apresentando um estado favorável após o fornecimento do atendimento de enfermagem.

22ª QUESTÃO - O período imediatamente depois da cirurgia, quando o paciente é levado à unidade de recuperação pós-anestésica ou unidade de terapia intensiva, pode representar o momento mais crucial da recuperação anestésica. Considerando os problemas potenciais do paciente no pós-operatório imediato, marque a alternativa **CORRETA**:

- A. () A hipertensão é classificada de acordo com seu grau de gravidade em leve, com pressão diastólica entre 105 e 120 mmHg, e grave, com pressão diastólica maior que 120 mmHg.
- B. () A hipertermia maligna é um distúrbio autossômico dominante herdado e raro, não relacionado a distúrbios da musculatura esquelética.
- C. () **A hipotensão é definida como uma diminuição de 25% a 30% na pressão arterial sistólica a partir do valor basal em repouso.**
- D. () A hipotermia está presente quando a temperatura corporal é inferior a 33º C. A perda calórica durante a cirurgia ocorre secundariamente ao metabolismo basal aumentado após a administração de relaxantes musculares.

23ª QUESTÃO – Com relação a intubação gastrointestinal, marque a alternativa **CORRETA**:

- A. () **A intubação gastrointestinal pode ser realizada para administração de medicamentos e alimentos e para a compressão de áreas de sangramento.**
- B. () A auscultação da área epigástrica com estetoscópio é o método mais preciso para confirmar o posicionamento da sonda gastrointestinal.
- C. () O método de alimentação através de sonda gástrica é preferível quando os pacientes estão sob o risco de aspiração.
- D. () A administração de dieta enteral em bolus, intermitente, reduz o risco de náuseas, vômitos e diarreia.

PROVA DO CONCURSO PÚBLICO P/ PROVIMENTO DE CARGO DE 2º TEN DO
QUADRO DE OFICIAIS DE SAÚDE (QOS) DA PMMG – 2009 (ENFERMEIRO)

24ª QUESTÃO - Muitos pacientes com angina de peito devem aprender como auto-administrar a nitroglicerina (agente vasoativo). Uma função primordial da enfermagem, nesses casos, é educar o paciente sobre a ação do medicamento e de como utilizá-lo. Considerando as orientações para a auto-administração da nitroglicerina, marque a alternativa **CORRETA**:

- A. () Por ser volátil e inativada pelo calor, o suprimento de nitroglicerina deve ser renovado a cada 12 meses.
- B. () Caso a dor não seja aliviada após o primeiro comprimido de nitroglicerina, o paciente deverá procurar o serviço de emergência mais próximo.
- C. () Quando a dor é intensa, o paciente deve esmagar o comprimido entre os dentes, a fim de acelerar a absorção sublingual.
- D. () Em geral a nitroglicerina sublingual é colocada sob a língua ou na bochecha, aliviando a dor da isquemia dentro de 5 minutos.

25ª QUESTÃO - Sobre os bloqueadores dos canais de cálcio, também conhecidos como antagonistas dos íons cálcio, marque a alternativa **CORRETA**:

- A. () Os três bloqueadores de cálcio mais comumente empregados no tratamento da angina de peito são a Nifedipina, Verapamil e o Enalapril.
- B. () Os bloqueadores dos canais de cálcio relaxam os vasos sanguíneos causando uma redução da pressão arterial e um aumento na perfusão arterial coronariana.
- C. () Entre os efeitos colaterais observados durante a utilização dos bloqueadores de cálcio estão a hipotensão arterial, a taquicardia, a constipação e o desconforto gástrico.
- D. () Os bloqueadores dos canais de cálcio aumentam o aporte miocárdico de oxigênio por dilatar a parede muscular das arteríolas coronarianas, elevam a pressão arterial e aumentam a carga do ventrículo esquerdo.

26ª QUESTÃO - Com relação aos cuidados e monitorização da pressão intracraniana (PIC), marque a alternativa **CORRETA**:

- A. () Quando a PIC é registrada, o transdutor de pressão é zerado e usualmente mantido ao nível da linha axilar média.
- B. () A terapia de hiperventilação é empregada para diminuir a PIC, por gerar vasodilatação cerebral e uma diminuição no volume sanguíneo cerebral.
- C. () Durante os procedimentos de enfermagem a PIC deve ser controlada e mantida acima de 25 mmHg, assegurando a adequada pressão de perfusão cerebral.
- D. () Temperatura elevada e frequência cardíaca e respiratória diminuídas são sinais tardios de PIC aumentada.

PROVA DO CONCURSO PÚBLICO P/ PROVIMENTO DE CARGO DE 2º TEN DO
QUADRO DE OFICIAIS DE SAÚDE (QOS) DA PMMG – 2009 (ENFERMEIRO)

27ª QUESTÃO - Considerando a assistência de enfermagem ao paciente em parada cárdio-pulmonar (PCR), marque a alternativa correta:

- A. () O objetivo da utilização do dispositivo bolsa-válvula (AMBU), durante a PCR é o de garantir a ventilação do paciente e fornecer até 40% de oxigênio quando conectado a fonte de alto fluxo.
- B. () Durante o suporte básico de vida as compressões cardíacas devem ser mantidas em uma velocidade de aproximadamente 80 batimentos por minuto e ventilação de 15 a 20 incursões respiratórias por minuto.
- C. () A liberação de um impulso elétrico por um desfibrilador externo despolariza simultaneamente a maioria das células atriais durante a fibrilação ventricular.
- D. () **A detecção de pulso radial durante o processo de reanimação pode ser utilizada como um indicador de massagem cardíaca eficaz.**

28ª QUESTÃO – Os dados obtidos através de uma ausculta cardíaca completa e cuidadosa são essenciais no planejamento e na avaliação dos cuidados dos pacientes criticamente enfermos. Considerando a técnica de ausculta cardíaca e seus achados, marque a alternativa **CORRETA**:

- A. () B1 (primeiro batimento cardíaco) é sincronizado com o fechamento das valvas semilunares aórtica e pulmonar e melhor ouvido na base do coração. Representa o início da sístole ventricular.
- B. () B2 (segundo batimento cardíaco) é um som de baixa frequência que ocorre durante a fase de enchimento rápido inicial da diástole ventricular e melhor ouvido no processo xifóide.
- C. () **B3 (terceiro batimento cardíaco) é um achado normal em crianças saudáveis, sendo melhor ouvido na borda esternal inferior, desaparecendo, geralmente, depois de 25 a 35 anos de idade.**
- D. () B4 (quarto batimento cardíaco) é um som diastólico tardio que ocorre exatamente antes de B2. Possui baixa frequência e é melhor ouvido no ápice e na borda esternal esquerda.

29ª QUESTÃO - O diabetes é um distúrbio metabólico complexo e crônico caracterizado por hiperglicemia e defeitos na secreção de insulina. Considerando esta afirmativa, marque a alternativa **CORRETA**:

- A. () A insulina regular tem ação rápida, agindo de 10 a 15 minutos após sua aplicação e é usualmente administrada depois do alimento .
- B. () O sucesso no tratamento da cetoacidose diabética está diretamente relacionado à queda súbita e rápida da glicemia com auxílio da insulina.
- C. () **Hiperosmolaridade, o acúmulo de cetoácidos e a depleção de volume são distúrbios fisiológicos da cetoacidose diabética (DKA).**
- D. () No coma hipoglicêmico ocorre uma maior utilização de glicose pelo músculo, tecido adiposo e fígado, o que leva a poliúria e a polidipsia.

PROVA DO CONCURSO PÚBLICO P/ PROVIMENTO DE CARGO DE 2º TEN DO
QUADRO DE OFICIAIS DE SAÚDE (QOS) DA PMMG – 2009 (ENFERMEIRO)

30ª QUESTÃO - Os rins desempenham suas funções através da filtração do plasma e remoção de substâncias do filtrado em graus variáveis, dependendo das necessidades do organismo. Considerando esta afirmação, marque a alternativa **CORRETA**:

- A. () Num homem normal de 70 Kg, o fluxo sanguíneo combinado através de ambos os rins é de cerca de 1200ml/min., ou seja, 21% do débito cardíaco.
- B. () A norepinefrina e a epinefrina são hormônios que produzem a vasodilatação dos vasos sanguíneos renais e aumento da filtração glomerular.
- C. () O hormônio antidiurético (ADH) atua no túbulo proximal e seu efeito é diminuir a reabsorção de Ca^{++} e NaCl.
- D. () Antes de ser excretado na forma de urina, o filtrado glomerular flui seqüencialmente através do ducto coletor, túbulo coletor, túbulo distal, alça de Henle e túbulo proximal.

31ª QUESTÃO - Considerando a prescrição de enfermagem para pacientes com traumas neurológicos e pressão intracraniana (PIC) elevada, marque alternativa **CORRETA**:

- A. () Obter o padrão respiratório normal: a pressão aumentada sobre os lobos frontais ou sobre as estruturas profundas de linha média podem resultar em hiperventilação, enquanto a pressão no mesencéfalo pode provocar a respiração de cheyne stokes.
- B. () Monitorar o equilíbrio hídrico: débito urinário superior a 200ml/h por 2 horas consecutivas pode indicar o início de diabetes insípido.
- C. () Preservar e melhorar a perfusão do tecido cerebral: a posição assentada deve ser incentivada para reduzir a pressão intra-torácica e intra-abdominal e conseqüentemente reduzir a PIC .
- D. () Prevenir a infecção: o risco de infecção é máximo quando a PIC é monitorizada com um cateter intraventricular. O curativo sobre o cateter deve ser mantido úmido prevenindo o ressecamento local e acelerando a cicatrização.

32ª QUESTÃO - De acordo com a terapia com sangue e hemoderivados, marque a alternativa **CORRETA**:

- A. () A reação não hemolítica aguda é considerada a reação transfusional de maior risco, ameaçando potencialmente a vida.
- B. () O sangue tipo “O” comumente denominado de doador universal, pode ser transfundido seguramente em uma situação de emergência.
- C. () Plaquetas provenientes de doadores em uso de Aspirina podem estar inativas ou sem função, tornando-se inapropriadas para transfusão.
- D. () História de hepatite viral há mais de 05 anos não desqualifica o doador de sangue.

PROVA DO CONCURSO PÚBLICO P/ PROVIMENTO DE CARGO DE 2º TEN DO
QUADRO DE OFICIAIS DE SAÚDE (QOS) DA PMMG – 2009 (ENFERMEIRO)

33ª QUESTÃO - Considerando a monitorização hemodinâmica invasiva, empregada rotineiramente na avaliação de pacientes criticamente enfermos, marque a alternativa **CORRETA**:

- A. () A pressão na veia cava ou no átrio direito é utilizada para avaliar a função ventricular esquerda e o retorno de sangue venoso para o coração direito.
- B. () A variação para a pressão venosa central normal é de 3 a 8 mmHg (sistema de monitorização de pressão) ou de 0 a 8 mmHg (manômetro de água).
- C. () Os cateteres utilizados para pressão venosa central são exclusivos para a mensuração da pressão, não podendo ser utilizados para a administração de medicamentos, líquidos endovenosos e coleta de amostras sanguíneas.
- D. () **A pressão venosa central pode ser medida de maneira correta com o paciente em decúbito dorsal, em qualquer posição de repouso com cabeceira até 45º, caso se tenha como referência o eixo flebostático.**

34ª QUESTÃO – São fatores de risco para a sepse da ferida cirúrgica:

- A. () Deiscência, evisceração, imobilidade.
- B. () **Corpo estranho, desidratação, desnutrição.**
- C. () Leucocitose, edema e calor local.
- D. () Dor, presença de secreção e elevação da frequência cardíaca.

35ª QUESTÃO – Com relação à assistência de enfermagem ao paciente em pós-operatório imediato, marque a alternativa **CORRETA**:

- A. () O decúbito dorsal com cabeceira a zero grau deve ser o posicionamento de escolha nas primeiras três horas após a cirurgia.
- B. () **A aspiração cuidadosa da orofaringe antes da extubação é medida importante na prevenção do laringoespasma.**
- C. () A alimentação enteral, quando indicada, deve ser iniciada imediatamente após o término da cirurgia, prevenido o catabolismo protéico.
- D. () A tosse e inspirações profundas devem ser desencorajadas nas primeiras horas após a cirurgia, uma vez que aumentam a dor e o desconforto do paciente.

PROVA DO CONCURSO PÚBLICO P/ PROVIMENTO DE CARGO DE 2º TEN DO
QUADRO DE OFICIAIS DE SAÚDE (QOS) DA PMMG – 2009 (ENFERMEIRO)

36ª QUESTÃO – Em relação ao procedimento de cardioversão elétrica, marque a alternativa **CORRETA**:

- A. () A modalidade de choque sincronizado pode ser descartada em pacientes com fibrilação atrial crônica ou em uso de digitálicos.
- B. () O choque na cardioversão elétrica deve ser liberado durante a repolarização ventricular, ou seja, durante a ocorrência da onda R.
- C. () Para a realização da cardioversão elétrica é exigido que o paciente permaneça em jejum via oral por 2 ou 3 horas.
- D. () **A intoxicação digitálica, a fibrilação atrial de duração desconhecida com anticoagulação inadequada e hipocalcemia são contra-indicações relativas a cardioversão.**

37ª QUESTÃO – Em relação às fases ou períodos que envolvem o ato cirúrgico, marque a alternativa **CORRETA**:

- A. () Fase pré-operatória: período de tempo que se estende desde a internação do paciente para a intervenção cirúrgica até a sua admissão no Centro Cirúrgico.
- B. () Fase pós-operatória: período de tempo que se estende desde o término da cirurgia até sua admissão na unidade pós anestésica.
- C. () **Fase intra-operatória: período de tempo que se estende desde a transferência do paciente para a mesa cirúrgica até sua admissão na unidade de cuidado pós anestésico .**
- D. () Período perioperatório: período de tempo que inclui as fases intra-operatória e pós operatória.

38ª QUESTÃO – Considerando os cuidados de enfermagem a pacientes em uso de oxigenoterapia, marque a alternativa **CORRETA**:

- A. () **Os pacientes com distúrbios respiratórios recebem oxigenoterapia apenas para elevar a pressão arterial de oxigênio (PaO₂) de volta a linha basal, ou seja, de 60 a 95 mmHg.**
- B. () O oxigênio é um medicamento mas, apesar disso, pode ser administrado rotineiramente sem prescrição médica.
- C. () O transporte de oxigênio para os tecidos independe de fatores como o débito cardíaco e demandas metabólicas .
- D. () A necessidade de oxigênio é avaliada diretamente pela oximetria de pulso, assim como pela evolução clínica do paciente.

PROVA DO CONCURSO PÚBLICO P/ PROVIMENTO DE CARGO DE 2º TEN DO
QUADRO DE OFICIAIS DE SAÚDE (QOS) DA PMMG – 2009 (ENFERMEIRO)

39ª QUESTÃO – Considerando as modalidades utilizadas no suporte ventilatório, do paciente crítico, marque a alternativa **CORRETA**:

- A. () Ventilação mandatória intermitente sincronizada: modo de ventilação mecânica que não permite ao paciente respirar espontaneamente, assegurando uma ventilação adequada em pacientes sem drive respiratório.
- B. () Ventilação controlada: modo de ventilação mecânica no qual o ventilador permite ao paciente respirar espontaneamente, conforme volume corrente e frequência respiratória estabelecidos.
- C. () Pressão expiratória final positiva: modo de ventilação mecânica que garante pressão positiva ao final da inspiração aumentando a capacidade residual funcional dos pulmões.
- D. () **Ventilação assistida – controlada: modo de ventilação mecânica no qual o padrão de respiração do paciente pode ativar o ventilador liberando para o paciente um volume corrente preestabelecido; na ausência de respiração espontânea a máquina administra uma respiração controlada.**

40ª QUESTÃO – A insuficiência respiratória aguda (IRpA) permanece como uma importante causa de morbi-mortalidade no ambiente da terapia intensiva, respondendo por 10% a 15% das internações nessas unidades. Considerando a fisiopatologia da IRpA, marque a alternativa **CORRETA**:

- A. () **Em pacientes com DPOC o diagnóstico de IRpA se fará com base em resultados gasométricos prévios e diminuição do pH sanguíneo arterial.**
- B. () Taquidispnéia (FR > 30 irpm), fadiga da musculatura respiratória e hipoxemia (PaO₂ < 60 mmHg) confirmam o diagnóstico de IRpA.
- C. () Na insuficiência respiratória hipercapnética aguda (tipo II) encontraremos ventilação alveolar aumentada, PaO₂ > 50 mmHg e PCO₂ alta.
- D. () Na insuficiência respiratória hipoxêmica aguda ou tipo I, encontraremos ventilação alveolar diminuída, PaO₂ < 50 mmHg e PCO₂ baixa.

corte aqui



RASCUNHO – GABARITO

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40

**PROVA DO CONCURSO PÚBLICO P/ PROVIMENTO DE CARGO DE 2º TEN DO
QUADRO DE OFICIAIS DE SAÚDE (QOS) DA PMMG – 2009 (ENFERMEIRO)**