



**PROCESSO DE SELEÇÃO PÚBLICA PARA ADMISSÃO AOS PROGRAMAS  
DE RESIDÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS  
GERAIS, PARA O ANO DE 2016.**

**RESIDÊNCIA MÉDICA/2016  
ENDOSCOPIA**

(Edital DRH/CRS nº 11/2015, de 08 de setembro de 2015)

Clínica Médica e Cirurgia Geral

NOME: \_\_\_\_\_.

CPF: \_\_\_\_\_ IDENTIDADE: \_\_\_\_\_.

LOCAL DE PROVA: \_\_\_\_\_ SALA: \_\_\_\_\_ DATA: 28/11/2015.

**INSTRUÇÕES AOS CANDIDATOS:**

1. Abra este caderno de prova somente quando autorizado.
2. Prova sem consulta.
3. Esta prova contém 40 (quarenta) questões valendo 2,25 (dois vírgula vinte cinco) pontos cada e valor total de 90 (noventa) pontos.
4. Para cada questão existe somente uma resposta.
5. Responda as questões e marque a opção desejada na folha de respostas, usando caneta (tinta azul ou preta).
6. Não será admitido qualquer tipo de rasura na folha de respostas. As questões rasuradas ou em branco ou com dupla marcação serão consideradas nulas para o candidato.
7. O tempo máximo permitido para a realização da prova será de 3 (três) horas, incluindo o preenchimento da folha de respostas.
8. É proibido o porte, a posse e o uso de computadores, máquinas calculadoras, telefones celulares, relógios de qualquer tipo ou outros similares.
9. Iniciada a prova, o candidato somente poderá deixar a sala, para uso de sanitário ou bebedouro, depois de transcorrido o tempo mínimo de 1h, devidamente acompanhado por fiscal do concurso.
10. Ao término da prova, entregue ao aplicador a folha de respostas e o caderno de provas, devidamente preenchido, conferido e assinado.

\_\_\_\_\_  
**ASSINATURA DO CANDIDATO**

## RASCUNHO

## RASCUNHO

## CLÍNICA MÉDICA

**1ª QUESTÃO** – As alterações de coloração das fezes por perdas gastrointestinais de sangue (melena) aparecem a partir de qual volume de perda sanguínea?

- A. ( ) 200 a 250ml/24hs.
- B. ( ) 250 a 300ml/24hs.
- C. ( ) 100 a 150ml/24hs.
- D. ( ) 350 a 350ml/24hs.

**2ª QUESTÃO** – Em média, quanto tempo leva um indivíduo infectado pelo HIV para desenvolver a Síndrome de Imunodeficiência Adquirida?

- A. ( ) 2 a 4 anos.
- B. ( ) 15 a 20 anos.
- C. ( ) Mais de 20 anos.
- D. ( ) 8 a 10 anos.

**3ª QUESTÃO** – Acerca da Difilobotríase, marque a alternativa CORRETA:

- A. ( ) É comum em pessoas que ingerem carne bovina mal cozida ou crua.
- B. ( ) Pode levar à anemia megaloblástica.
- C. ( ) Levamisol é o tratamento de escolha.
- D. ( ) Causa frequentemente anemia microcítica e hipocrômica.

**4ª QUESTÃO** – Qual dos métodos abaixo seria melhor indicado para o diagnóstico de refluxo gastroesofágico ácido patológico?

- A. ( ) pHmetria ambulatorial de 24 hs.
- B. ( ) Manometria esofagiana.
- C. ( ) Ressonância Nuclear Magnética.
- D. ( ) Esofagograma.

**5ª QUESTÃO** – Marque a alternativa CORRETA. É a mais comum das malformações gástricas:

- A. ( ) Estenose hipertrófica do piloro.
- B. ( ) Microgastria.
- C. ( ) Atresia cardíaca.
- D. ( ) Duplicação gástrica.

**6ª QUESTÃO** – Marque a alternativa CORRETA. Trata-se de uma doença metabólica, em que se observa uma icterícia, com predomínio da fração conjugada, níveis séricos normais de fosfatase alcalina e gamaglutamiltransferase.

- A. ( ) Síndrome de Gilbert.
- B. ( ) Síndrome de Rotor.
- C. ( ) Síndrome de Lucey-Driscoll.
- D. ( ) Síndrome de Crigler-Najjar I.

**7ª QUESTÃO** – Com relação à trombose de veia porta, marque a alternativa CORRETA:

- A. ( ) O uso de anticoagulantes não deve ser instituído na fase aguda da doença.
- B. ( ) É uma causa frequente de hipertensão porta.
- C. ( ) O infarto mesentérico é a mais grave complicação da trombose porta, desenvolvendo-se quando o diagnóstico é tardio e há trombose em arcos venosos mesentéricos.
- D. ( ) A repermeabilização espontânea da trombose ocorre na maioria dos casos.

**8ª QUESTÃO** – Com relação à doença policística pancreática, marque a alternativa CORRETA:

- A. ( ) Manifesta-se com frequência como uma insuficiência exócrina grave.
- B. ( ) Raramente está associada à doença policística hepática e renal.
- C. ( ) Está associada à uma pancreatite crônica.
- D. ( ) Pode estar associada à síndrome de Hippel-Lindau.

**9ª QUESTÃO** – Marque a alternativa CORRETA. É considerado um fator de risco para o desenvolvimento de carcinoma hepatocelular em pacientes com infecção crônica pelo vírus B:

- A. ( ) Sexo feminino.
- B. ( ) Ausência de replicação.
- C. ( ) Infecção anterior pelo vírus A.
- D. ( ) Uso abusivo de etanol.

**10ª QUESTÃO** – Diante do paciente cirrótico, com abdome ascítico, evoluindo com hemorragia digestiva alta, de provável etiologia varicosa, é CORRETO afirmar:

- A. ( ) A endoscopia digestiva alta deve ser realizada de imediato, antes mesmo da estabilização hemodinâmica do paciente.
- B. ( ) Deve ser instituída terapêutica com vasopressores na tentativa de controle do sangramento e estabilização do paciente.
- C. ( ) Nunca deve ser instituído antibiótico para profilaxia de peritonite bacteriana espontânea.
- D. ( ) O balão de Sangstaken-Blakemore é considerado a primeira opção terapêutica em pacientes estáveis hemodinamicamente.

**11ª QUESTÃO** – É um fator associado com o aumento da hepatotoxicidade pelo Metotrexato:

- A. ( ) Extensão das lesões cutâneas da psoríase.
- B. ( ) Sexo feminino.
- C. ( ) Uso diário e prolongado do medicamento.
- D. ( ) Idade.

**12ª QUESTÃO** – Marque a alternativa CORRETA. É uma complicação da Colelitíase:

- A. ( ) Síndrome de Bouveret.
- B. ( ) Câncer gástrico.
- C. ( ) Úlcera duodenal.
- D. ( ) Diverticulite aguda.

**13ª QUESTÃO** – Acerca das parasitoses intestinais, marque a alternativa CORRETA:

- A. ( ) Não está indicado o tratamento medicamentoso nas teníases assintomáticas.
- B. ( ) A amebíase pode apresentar-se como uma forma pseudotumoral, causando um quadro de obstrução intestinal.
- C. ( ) O tratamento da infecção pelo *Hymenolepis nana* é realizado com corticóide e furazolidona.
- D. ( ) A giardíase é uma causa frequente de hemorragia digestiva baixa.

**14ª QUESTÃO** – Marque a alternativa CORRETA. É uma causa de constipação intestinal:

- A. ( ) Neuropatia autonômica.
- B. ( ) Hipertireoidismo.
- C. ( ) Hipocalcemia.
- D. ( ) Fibromialgia.

**15ª QUESTÃO** – Em relação à Síndrome de Cushing, marque a alternativa CORRETA:

- A. ( ) Algumas das alterações hematológicas relacionadas ao hipercortisolismo são: leucopenia e eosinopenia.
- B. ( ) A taxa de remissão pós ressecção transesfenoidal seletiva é de cerca de 20% para microadenomas.
- C. ( ) Níveis de ACTH são 8(oito) vezes mais altos nos pacientes com adenomas hipofisários do que naqueles com secreção ectópica do ACTH.
- D. ( ) Os adenomas dos corticotrofos hipofisários são responsáveis por 70% dos pacientes com causas endógenas da síndrome de Cushing.

**16ª QUESTÃO** – Analise as assertivas abaixo e marque a alternativa CORRETA:

- A. ( ) A espondilite anquilosante tem prevalência maior em mulheres do que em homens.
- B. ( ) O aumento das parótidas, ou de outras glândulas salivares maiores é comum na Síndrome de Sjogren secundária.

- C. ( ) Em 15 a 20% dos casos de artrite psoriásica, a artrite precede o início da psoríase.
- D. ( ) O fenômeno de Raynaud é mais frequente em homens.

**17ª QUESTÃO** – Analise as assertivas abaixo e marque a alternativa CORRETA:

- A. ( ) As crises tônico-clônicas de início generalizado são o principal tipo de crise em cerca de 10% de todas as pessoas com epilepsia.
- B. ( ) As crises de ausência típicas começam habitualmente na idade adulta.
- C. ( ) As crises de ausência atípicas têm melhor resposta ao tratamento com anticonvulsivantes quando comparadas às crises de ausência típicas.
- D. ( ) A síndrome de Lennox - Gastaut caracteriza-se pela tríade: presença de um único tipo de crise epiléptica, EEG com descarga em ponta – ondas lentas e disfunção cognitiva na maioria dos casos, mas não em todos.

**18ª QUESTÃO** – Marque a alternativa CORRETA. A pancitopenia com medula óssea hipocelular acontece na seguinte situação:

- A. ( ) Mielodisplasia.
- B. ( ) Lupus eritematoso sistêmico.
- C. ( ) Tuberculose.
- D. ( ) Anemia aplásica adquirida.

**19ª QUESTÃO** – Marque a alternativa CORRETA. É fator de risco para fratura por osteoporose:

- A. ( ) Obesidade.
- B. ( ) Sexo feminino.
- C. ( ) Raça negra.
- D. ( ) Cardiopatia associada.

**20ª QUESTÃO** – Marque a alternativa CORRETA. É característica da Febre de origem obscura:

- A. ( ) Temperaturas axilares maiores ou iguais a 37,8° C (graus Celsius) em várias ocasiões.
- B. ( ) Febre com duração maior que 4 (quatro) semanas.
- C. ( ) Impossibilidade de estabelecer um diagnóstico apesar de 1 (uma) semana de investigação hospitalar.
- D. ( ) Os abscessos intra-abdominais são as causas mais comuns dessa entidade.

**RASCUNHO**

**RASCUNHO**



## CIRURGIA GERAL

**21ª QUESTÃO** – Em relação Classificação de Hill das hérnias paraesofágicas, marque a alternativa CORRETA:

- A. ( ) Tipo I – Hérnia de deslizamento – o tipo mais comum, a transição esofagogástrica migra através do hiato em direção cranial.
- B. ( ) Tipo II – Hérnia paraesofágica – o fundo gástrico migra junto com a transição esofagogástrica.
- C. ( ) Tipo III – Envolve migração de outras estruturas e órgãos como o omento ou cólon transversos.
- D. ( ) Tipo IV – Combinação dos tipos II e III.

**22ª QUESTÃO** – Considerando a hemorragia digestiva alta causada pela úlcera péptica gastroduodenal, marque a alternativa CORRETA:

- A. ( ) Segundo a Classificação de Forrest, as úlceras Ia, Ib, IIa e IIb apresentam alto risco de ressangramento.
- B. ( ) Existem dados que demonstram claramente que uma segunda endoscopia para tratamento dos doentes que ressangram na mesma internação é a melhor opção.
- C. ( ) Os doentes com antecedentes de tabagismo, alcoolismo, doença péptica ou diabetes *mellitus*, bem como os admitidos em choque são operados significativamente com maior frequência.
- D. ( ) Historicamente, úlceras localizadas em parede anterior do duodeno ou pequena curvatura gástrica são associadas a maior necessidade de tratamento cirúrgico.

**23ª QUESTÃO** – Considerando a classificação e estadiamento dos carcinomas gástricos da “American Joint Cancer Commission (AJCC) tumor node metastases (TNM) staging system”, um paciente classificado com T2 N1 M0 encontra-se no estadiamento:

- A. ( ) I.
- B. ( ) II.
- C. ( ) III.
- D. ( ) IV.

**24ª QUESTÃO** – Considerando as hérnias da parede abdominal, marque a alternativa CORRETA:

- A. ( ) Nos pacientes de risco, o uso de pontos totais de reforço diminui o risco de hérnia incisional.
- B. ( ) A hérnia crural – femoral é mais comum em mulheres. A técnica cirúrgica para correção desse tipo de hérnia é igual à utilizada na hérnia inguinal.
- C. ( ) A técnica de Lichtenstein para reparo cirúrgico de hérnias inguinais está associado a alto índice de recidiva herniário.
- D. ( ) O aparecimento da hérnia incisional é precoce, geralmente nos primeiros 3 (três) meses após a operação.

**25ª QUESTÃO** – Em relação à apendicite aguda na paciente gestante, marque a alternativa CORRETA:

- A. ( ) A via laparoscópica não pode ser utilizada nas fases mais avançadas da gestação, como no terceiro trimestre.
- B. ( ) A incidência da apendicite aguda é maior em não grávidas em comparação às gestantes.
- C. ( ) Ocorre com maior frequência no terceiro trimestre da gestação.
- D. ( ) A ocorrência das formas complicadas de apendicite aguda é o principal fator relacionado à mortalidade materna.

**26ª QUESTÃO** – Sobre a definição do risco pré-operatório, marque a alternativa CORRETA:

- A. ( ) O tipo de procedimento cirúrgico não está intimamente relacionado ao risco operatório.
- B. ( ) A classificação do estado físico padronizada pela Sociedade Americana de Anestesiologia (ASA) é a mais utilizada por ser simples e razoavelmente acurada.
- C. ( ) Os índices de avaliação pré-operatória de Detsky e Goldman não levam em consideração o procedimento cirúrgico e sim a condição cardiorrespiratória.
- D. ( ) A escala de Torrington e Henderson refere-se tão somente ao risco de morte.

**27ª QUESTÃO** – Em relação às características de um curativo ideal para a ferida cirúrgica, marque a alternativa CORRETA:

- A. ( ) Deve possibilitar a oclusão da ferida, mantendo-a completamente seca.
- B. ( ) Deve permitir a livre movimentação dos tecidos adjacentes à ferida.
- C. ( ) Deve ser impermeável, diminuindo a contaminação da ferida e o risco de infecção incisional.
- D. ( ) Não deve absorver o exsudato, pois a absorção do mesmo provoca maceração da pele.

**28ª QUESTÃO** – Sobre os principais antissépticos atualmente empregados na prática cirúrgica hospitalar, marque a alternativa CORRETA:

- A. ( ) O álcool etílico a 70% tem a mais rápida velocidade de ação dentre os antissépticos mais utilizados.
- B. ( ) A clorexidina tem sua atividade reduzida em presença de material orgânico.
- C. ( ) O álcool iodado tem efeito residual significativo em comparação aos demais produtos.
- D. ( ) Os iodóforos (PVP-I) apresentam ação superior sobre microbactérias em comparação ao álcool etílico.

**29ª QUESTÃO** – Sobre as vantagens e desvantagens das técnicas de avaliação nutricional do paciente cirúrgico, marque a alternativa CORRETA:

- A. ( ) Os testes bioquímicos raramente encontram-se alterados em outras doenças e não apenas desnutrição.
- B. ( ) O IMC depende da composição corporal e apresenta aplicação limitada em pacientes acamados e na presença de edema.
- C. ( ) Os testes funcionais avaliam a força muscular e apresentam a vantagem de não haver a necessidade de aparelhos adequados e nem experiência com a técnica.
- D. ( ) A avaliação subjetiva global é fácil de ser realizada e bastante adequada ao seguimento.

**30ª QUESTÃO** – Sobre as principais repercussões clínicas da estenose pilórica, marque a alternativa CORRETA:

- A. ( ) Acidose metabólica.
- B. ( ) Hiperprotrombinemia.
- C. ( ) Hipercloremia.
- D. ( ) Hipopotassemia e hiponatremia.

**31ª QUESTÃO** – Marque a alternativa CORRETA. A Regra de Goodsall é utilizada para qual patologia anorretal?

- A. ( ) Doença hemorroidária.
- B. ( ) Fissura anal.
- C. ( ) Fístula anal.
- D. ( ) Tumor anal benigno.

**32ª QUESTÃO** – Dentre as opções abaixo, marque a alternativa CORRETA que representa um tumor neurogênico pré-sacral benigno:

- A. ( ) Neuroblastoma.
- B. ( ) Ganglioneuroblastoma.
- C. ( ) Ependimoma.
- D. ( ) Neurofibroma.

**33ª QUESTÃO** – Marque a alternativa CORRETA. Qual deve ser o primeiro exame realizado na abordagem de um paciente com hemorragia digestiva baixa?

- A. ( ) Colonoscopia.
- B. ( ) Exame proctológico.
- C. ( ) Arteriografia.
- D. ( ) Cintilografia.

**34ª QUESTÃO** – Marque a alternativa CORRETA. As técnicas cirúrgicas de Ripstein, Delorme e Thiersch são utilizadas para tratamento de qual das patologias abaixo?

- A. ( ) Tumor de reto baixo.
- B. ( ) Fístula retovaginal.

- C. ( ) Prolapso retal.
- D. ( ) Trauma retal.

**35ª QUESTÃO** – Analise as assertivas abaixo e marque a alternativa CORRETA:

- A. ( ) Através do exame de anoscopia podemos examinar a parte inferior da mucosa retal, a mucosa anal, o anoderma, a linha pectínea e os plexos hemorroidários internos e externos.
- B. ( ) A anoscopia é um exame utilizado para rastreamento do câncer colorretal.
- C. ( ) Dor intensa não é contra-indicação à realização do exame de anoscopia.
- D. ( ) A posição mais adequada para a realização da anoscopia é o decúbito ventral.

**36ª QUESTÃO** – Analise as assertivas abaixo e marque a alternativa CORRETA:

- A. ( ) Lesões de serosa nunca precisam de reparo/sutura.
- B. ( ) Fístula enterocutânea não pode ser considerada uma manifestação de lesão de alça intestinal.
- C. ( ) Fístulas de alto débito costumam fechar sem necessidade de jejum ou outras intervenções.
- D. ( ) Pacientes submetidos à lise de aderências extensas carregam risco elevado de lesão de alças intestinais.

**37ª QUESTÃO** – Analise as assertivas abaixo e marque a alternativa CORRETA:

- A. ( ) Sepse pélvica não é uma complicação de ligadura elástica de mamilos hemorroidários.
- B. ( ) Ligadura elástica de mamilos hemorroidários, um dos tratamentos da doença hemorroidária, apresenta como principais complicações: dor, trombose, sangramento e retenção urinária.
- C. ( ) Hemorroidectomia aberta à Fergusson é a principal técnica operatória utilizada para tratamento cirúrgico da doença hemorroidária.
- D. ( ) Impactação fecal é a principal complicação da hemorroidectomia.

**38ª QUESTÃO** – Analise as assertivas abaixo e marque a alternativa CORRETA:

- A. ( ) Trabalho de parto laborioso não contribui para o surgimento de fístula retovaginal.
- B. ( ) O uso de selante de fibrina é o tratamento mais eficaz para fístula retovaginal.
- C. ( ) As fístulas retovaginais decorrentes de Doença de Crohn devem ser manejadas clinicamente com uso de corticosteroides.
- D. ( ) Lesões obstétricas são a causa mais comum de fístula retovaginal.

**39ª QUESTÃO** – Dentre as opções abaixo marque a alternativa que apresenta a CORRETA associação entre a Doença Sexualmente Transmitida e seu agente etiológico:

- A. ( ) Sífilis- Treponema pallidum.
- B. ( ) Linfogranuloma venéreo- Hemophilus ducreyi.
- C. ( ) Condiloma acuminado- Cytomegalovirus.
- D. ( ) Granuloma Inguinal- Chlamydia.

**40ª QUESTÃO** – O local mais comum de aparecimento de focos de endometriose é:

- A. ( ) Junção retossigmoideana.
- B. ( ) Bexiga.
- C. ( ) Ovário.
- D. ( ) Fundo de saco de Douglas.

**RASCUNHO**

**RASCUNHO**

## RASCUNHO

## RASCUNHO

## RASCUNHO

## RASCUNHO

-----corte aqui-----

### RASCUNHO DO GABARITO

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40