

POLÍCIA MILITAR

DE MINAS GERAIS

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO

**CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO NO QUADRO DE OFICIAIS
DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS PARA O ANO DE 2022.**

**QOS/2022 – CIRURGIA PLÁSTICA
(Edital nº 08/2021, de 28 de junho de 2021)**

GABARITO PRELIMINAR

1ª QUESTÃO	A	B	C	D
2ª QUESTÃO	A	B	C	D
3ª QUESTÃO	A	B	C	D
4ª QUESTÃO	A	B	C	D
5ª QUESTÃO	A	B	C	D
6ª QUESTÃO	A	B	C	D
7ª QUESTÃO	A	B	C	D
8ª QUESTÃO	A	B	C	D
9ª QUESTÃO	A	B	C	D
10ª QUESTÃO	A	B	C	D
11ª QUESTÃO	A	B	C	D
12ª QUESTÃO	A	B	C	D
13ª QUESTÃO	A	B	C	D
14ª QUESTÃO	A	B	C	D
15ª QUESTÃO	A	B	C	D
16ª QUESTÃO	A	B	C	D
17ª QUESTÃO	A	B	C	D
18ª QUESTÃO	A	B	C	D
19ª QUESTÃO	A	B	C	D
20ª QUESTÃO	A	B	C	D

21ª QUESTÃO	A	B	C	D
22ª QUESTÃO	A	B	C	D
23ª QUESTÃO	A	B	C	D
24ª QUESTÃO	A	B	C	D
25ª QUESTÃO	A	B	C	D
26ª QUESTÃO	A	B	C	D
27ª QUESTÃO	A	B	C	D
28ª QUESTÃO	A	B	C	D
29ª QUESTÃO	A	B	C	D
30ª QUESTÃO	A	B	C	D
31ª QUESTÃO	A	B	C	D
32ª QUESTÃO	A	B	C	D
33ª QUESTÃO	A	B	C	D
34ª QUESTÃO	A	B	C	D
35ª QUESTÃO	A	B	C	D
36ª QUESTÃO	A	B	C	D
37ª QUESTÃO	A	B	C	D
38ª QUESTÃO	A	B	C	D
39ª QUESTÃO	A	B	C	D
40ª QUESTÃO	A	B	C	D

Belo Horizonte, 30 de agosto de 2021.

**(a) CLAUDIO APARECIDO DA SILVA, TEN CEL PM
CHEFE DO CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO**



**DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO**



CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO NO QUADRO DE OFICIAIS DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, PARA O ANO DE 2022 (QOS-PM/2022).

QOS-PM/2022 – CIRURGIA PLÁSTICA

(Edital DRH/CRS n. 08/2021, de 28 de junho de 2021).

Língua Portuguesa – Direitos Humanos – Ética Médica – Conhecimentos Específicos.

NOME: _____.

CPF: _____ **IDENTIDADE:** _____.

CIDADE PROVA: _____ **SALA:** _____.

ESCOLA: _____ **DATA:** _____.

ORIENTAÇÕES AOS CANDIDATOS:

1. Respeitar rigorosamente as normas de prevenção da COVID-19.
2. Abra este caderno de prova somente quando autorizado.
3. Prova sem consulta.
4. Esta prova contém 40 (quarenta) questões, valendo 2,5 (dois vírgula cinco) pontos cada e valor total de 100 (cem) pontos.
5. Para cada questão existe somente uma resposta correta.
6. Responda as questões e marque a opção na folha de respostas, usando caneta (tinta azul ou preta). É proibido utilizar lápis, lapiseira ou similares e borracha.
7. Não será admitido qualquer tipo de rasura na folha de respostas. As questões rasuradas ou em branco ou com dupla marcação serão consideradas nulas para o candidato.
8. O tempo máximo permitido para a realização da prova será de 03 (três) horas, incluindo o preenchimento da folha de respostas.
9. É proibido o porte, a posse de lápis, lapiseira, borracha, de aparelhos e equipamentos eletrônicos, computadores, máquinas calculadoras, telefones celulares, relógios de qualquer tipo, alarmes de veículos, chaves ou outros similares.
10. Iniciada a prova, os candidatos somente poderão deixar a sala, e a esta retornar, exclusivamente para uso de sanitários ou bebedouros (respeitadas as regras de controle e prevenção da COVID-19) depois de transcorrido o tempo mínimo de 01h (uma hora), e devidamente acompanhados por fiscal do concurso.
11. Ao final da prova, entregue ao aplicador a folha de respostas da prova objetiva e o caderno de provas, devidamente preenchidos, conferidos e assinados.

Assinatura do Candidato

LÍNGUA PORTUGUESA

Para responder as questões de 1 a 4, leia o texto “O fumo e a sobrevivência” de Dráuzio Varela:

O fumo e a sobrevivência**Dráuzio Varela**

Para quem gosta de morrer mais cedo, o cigarro é arma de eficácia incomparável. Ele reduz de tal forma a duração da vida que nenhuma medida isolada de saúde pública tem tanto impacto na redução da mortalidade quanto parar de fumar.

Acaba de ser publicado o levantamento mais completo sobre os índices de mortalidade em fumantes e ex-fumantes. Os dados foram colhidos entre 113.752 mulheres e 88.496 homens, de 25 a 79 anos de idade, acompanhados durante 7 anos.

Em média, os fumantes consumiam mais álcool, tinham nível educacional mais baixo e índice de massa corpórea menor do que o dos ex-fumantes e daqueles que nunca fumaram.

Cerca de 2/3 dos que foram ou ainda são fumantes adquiriram a dependência antes dos 20 anos, dado que explica o esforço criminoso da publicidade dirigida para viciar crianças e adolescentes.

As curvas de mortalidade revelaram que:

1- Continuar fumando encurta 11 anos na vida de uma mulher e 12 anos na vida do homem.

2- Comparado com os que nunca fumaram, o risco de morte de um fumante é três vezes maior. Mulheres correm riscos iguais aos dos homens, confirmando o adágio “mulher que fuma como homem, morre como homem”.

3- Uma pessoa que nunca fumou tem duas vezes mais chance de chegar aos 80 anos. Na mulher de hoje, a probabilidade de sobreviver até essa idade é de 70%, número que cai para 38% nas fumantes. Nos homens esses valores são de 61% e de 26%, respectivamente.

4- A diferença de sobrevivência é explicada pela incidência mais alta de câncer, doenças cardiovasculares, doenças pulmonares obstrutivo-crônicas (como o enfisema) e outras enfermidades provocadas pelo fumo. As causas de mortes mais frequentes são câncer de pulmão, infarto do miocárdio e derrame cerebral.

5- Na faixa de 25 a 79 anos de idade, cerca de 60% de todas as mortes são causadas pelo cigarro.

[...]

Como o cigarro perde espaço no mundo industrializado, e em países como o Brasil, as multinacionais têm agido com agressividade nos mercados asiáticos e africanos, valendo-se da falta de instrução das populações mais pobres e da legislação frouxa que permite a publicidade predatória.

Os epidemiologistas estimam que essa estratégia macabra fará o número de mortes causadas pelo cigarro- que foi de 100 milhões no século 20 – saltar para 1 bilhão no século atual.

(Folha de S. Paulo, 9/3/2013.)

1ª QUESTÃO – O avanço das indústrias de cigarro em países asiáticos e africanos se deve:

- A. () ao predomínio de população jovem nesses países.
- B. () à falta tanto de instrução das populações mais pobres como de uma legislação mais rígida.
- C. () ao grande número de mortes associadas ao consumo de cigarro em países desenvolvidos.
- D. () ao fato de esses países serem ainda mercados não explorados pela indústria do fumo.

2ª QUESTÃO – A tese defendida por Dráuzio Varella, no texto, é a de que:

- A. () O grupo de fumantes é constituído predominantemente por homens.
- B. () Com a perda de espaço do cigarro no mundo industrializado, estima-se que as mortes causadas por ele sofrerão um decréscimo.
- C. () Os fumantes são basicamente adolescentes.
- D. () O cigarro seguramente diminui a longevidade dos fumantes.

3ª QUESTÃO – Para fundamentar sua tese, o autor utiliza como argumentos os dados de uma pesquisa que envolveu mais de 200 mil pessoas. Considere estas afirmativas sobre a pesquisa:

- I. O estudo foi feito exclusivamente com pessoas fumantes de diferentes idades.
- II. Homens e mulheres fumantes vivem 11 anos a menos do que os não fumantes.
- III. Os dados do estudo permitem comparar fumantes e ex-fumantes, bem como fumantes e não-fumantes homens e mulheres.
- IV. Os fumantes são mais atingidos por doenças cardiovasculares, doenças pulmonares e câncer do que os não fumantes.
- V. O cigarro é a principal causa de morte entre pessoas de 25 a 79 anos.

São **CORRETAS** as afirmativas:

- A. () II, IV e V, somente.
- B. () I, IV e V, somente.
- C. () III, IV e V, somente.
- D. () I, II e IV, somente.

4ª QUESTÃO – No primeiro parágrafo do texto, há sarcasmo no trecho:

- A. () “Para quem gosta de morrer mais cedo, o cigarro é arma de eficácia incomparável”.
- B. () “O cigarro é arma de eficácia incomparável”.
- C. () “Nenhuma medida isolada de saúde pública tem tanto impacto [...] quanto parar de fumar”.
- D. () “Tem tanto impacto na redução da mortalidade quanto parar de fumar”.

GRAMÁTICA

5ª QUESTÃO – A acentuação é o processo fonético que consiste em pôr em relevo, através da modulação dos parâmetros prosódicos, uma sílaba de palavra ou de um grupo de palavras, conferindo à sua pronúncia características fônicas capazes de distingui-las das sílabas que lhe são contíguas. São acentuadas pela mesma regra de “**alguém, inverossímil e caráter**”, o seguinte grupo de palavras:

- A. () Hífen, também, impossível.
- B. () Armazém, útil, açúcar.
- C. () Há, impossível, filosófico.
- D. () Pólen, porém, nós.

6ª QUESTÃO – A formação de palavras, em Língua Portuguesa, tem, basicamente, dois processos: derivação e composição. Levando-se em consideração tal assertiva, indique na ordem, respectiva, qual foi o processo utilizado no seguinte grupo de palavras: “**passatempo, planalto e intolerante**”:

- A. () Aglutinação, justaposição e prefixação.
- B. () Prefixação, justaposição e aglutinação.
- C. () Justaposição, aglutinação e prefixação.
- D. () Justaposição, prefixação e aglutinação.

7ª QUESTÃO – Em Língua Portuguesa há dois processos de composição de períodos: coordenação e subordinação. Indique qual o período em que há oração subordinada substantiva subjetiva:

- A. () Consta que as contas de água e luz já foram pagas.
- B. () Logo notei que ele estava feliz.
- C. () O problema é que o prazo para as inscrições já terminou.
- D. () Estava convicto de que as contas de água e luz já foram pagas.

8ª QUESTÃO – As orações subordinadas adjetivas exercem, como os adjetivos, a função de adjunto adnominal. Indique, dentre as opções abaixo, a que apresenta uma oração subordinada adjetiva:

- A. () A natureza é sempre diferente ou não consegue fazer igual.
- B. () É provável que ele não venha.
- C. () Vi meu amigo ao longe e ele também me reconheceu.
- D. () A resposta que você me deu foi satisfatória.

9ª QUESTÃO – Sintaxe é o estudo das regras que regem a construção de frases nas línguas naturais. Observe o enunciado: “Há coisas **que** aprendemos tarde”. O pronome relativo “que” exerce a função sintática de:

- A. () objeto indireto.
- B. () sujeito.
- C. () objeto direto.
- D. () agente da passiva.

DIREITOS HUMANOS

10ª QUESTÃO – A Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada e proclamada pela Organização das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948, instituiu a proteção universal dos direitos inerentes a todo homem. Nesse sentido, nos termos da referida Declaração, marque a alternativa **CORRETA**:

- A. () Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante, salvo nos casos de guerra declarada.
- B. () Todo ser humano tem direito a igual remuneração por igual trabalho, sendo permitido, porém, distinção em razão do gênero.
- C. () Todo ser humano tem direito à propriedade, só ou em sociedade com outro, respeitada a função social da propriedade.
- D. () Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado.

11ª QUESTÃO – Acerca do direito à liberdade pessoal, nos termos do Pacto de São José da Costa Rica, é **CORRETO** afirmar que:

- A. () Ninguém pode ser submetido à detenção ou ao encarceramento, salvo após condenação, em duas instâncias, por juízo competente. Na hipótese de prisão, o preso deverá ser informado de seus direitos, dentre eles, o direito de permanecer calado e de ser assistido por advogado.
- B. () Toda pessoa detida ou retida deve ser conduzida, sem demora, à presença de um juiz ou outra autoridade autorizada pela lei a exercer funções judiciais e tem direito a ser julgada dentro de um prazo razoável ou a ser posta em liberdade, sem prejuízo de que prossiga o processo. Sua liberdade pode ser condicionada a garantias que assegurem o seu comparecimento em juízo.
- C. () Toda pessoa detida ou retida deve ser informada das razões da sua detenção e notificada, no prazo de 48 horas, da acusação ou acusações formuladas contra ela.
- D. () Não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel.

12ª QUESTÃO – Dentre as garantias judiciais elencadas no **Pacto de São José da Costa Rica**, é **CORRETO** afirmar que:

- A. () É direito da defesa de inquirir as testemunhas presentes no tribunal e de obter o comparecimento, como testemunhas ou peritos, de outras pessoas que possam lançar luz sobre os fatos.
- B. () É direito do acusado de ser assistido gratuitamente por defensor público, nas hipóteses em que não compreender ou não falar o idioma do juízo ou tribunal.
- C. () É direito do acusado ser assistido por um defensor de sua escolha e de comunicar-se, livremente e em particular com este, sendo vedado que o acusado se defenda pessoalmente.
- D. () A regra no processo penal é que este deve ser privado, pois visa resguardar o direito à intimidade das partes, salvo no que for necessário para preservar os interesses da justiça.

13ª QUESTÃO – O Pacto de São José da Costa Rica instituiu dois órgãos competentes para conhecer dos assuntos relacionados com o cumprimento dos compromissos assumidos pelos Estados-Partes nesta Convenção. Nesses termos, relacione a primeira coluna de acordo com a segunda e marque a alternativa que traz a sequência **CORRETA**, na ordem de cima para baixo:

- | | |
|---|---|
| <p>() Compor-se-á de sete membros, que deverão ser pessoas de alta autoridade moral e de reconhecido saber em matéria de direitos humanos.</p> <p>() Representa todos os Membros da Organização dos Estados Americanos.</p> <p>() Compor-se-á de sete juízes, nacionais dos Estados Membros da Organização, eleitos a título pessoal dentre juristas da mais alta autoridade moral, de reconhecida competência em matéria de direitos humanos, que reúnam as condições requeridas para o exercício das mais elevadas funções judiciais, de acordo com a lei do Estado do qual sejam nacionais, ou do Estado que os propuser como candidatos.</p> <p>() Os membros serão eleitos por um período de seis anos e só poderão ser reeleitos uma vez.</p> <p>() Os membros serão eleitos por quatro anos e só poderão ser reeleitos uma vez.</p> | <p>(1) Comissão Interamericana de Direitos Humanos.</p> <p>(2) Corte Interamericana de Direitos Humanos</p> |
|---|---|

- A. () 1, 1, 2, 1, 2.
 B. () 2, 1, 1, 2, 1.
 C. () 1, 1, 2, 2, 1.
 D. () 1, 2, 1, 2, 1.

ÉTICA MÉDICA

14ª QUESTÃO – Considerando o Capítulo XI do **Código de Ética Médica – Resolução CFM n. 2.217/2018**, que trata de Auditoria e Perícia Médica, é **CORRETO** afirmar:

- A. () É vedado ao médico realizar exames médico-periciais de corpo de delito em seres humanos no interior de prédios ou de dependências de delegacias de polícia, unidades militares, casas de detenção e presídios.
- B. () É vedado ao médico atuar com absoluta isenção quando designado para servir como perito ou como auditor, bem como ultrapassar os limites de suas atribuições e de sua competência.
- C. () É permitido ao médico assinar laudos periciais, auditoriais ou de verificação médico legal quando não tenha realizado pessoalmente o exame.
- D. () É permitido ao médico intervir, quando em função de auditor, assistente técnico ou perito, nos atos profissionais de outro médico, ou fazer qualquer apreciação em presença do examinado, reservando suas observações para o relatório.

15ª QUESTÃO – Considerando a **Resolução CFM n. 1658/2002**, que normatiza a emissão de atestados médicos e dá outras providências, é **CORRETO** afirmar:

- A. () Ao fornecer o atestado, deverá o médico registrar em ficha própria e/ou prontuário médico apenas os tratamentos realizados, de maneira que possa atender às pesquisas de informações dos médicos peritos das empresas ou dos órgãos públicos da Previdência Social e da Justiça.
- B. () O atestado médico é parte integrante do ato médico, sendo seu fornecimento direito inalienável do paciente, não podendo importar em qualquer majoração de honorários.
- C. () Não é obrigatória, aos médicos, a exigência de prova de identidade aos interessados na obtenção de atestados de qualquer natureza envolvendo assuntos de saúde ou doença.
- D. () Os médicos somente podem fornecer atestados com o diagnóstico codificado ou não quando por justa causa, exercício de dever legal, solicitação do próprio paciente ou de seu acompanhante.

16ª QUESTÃO – Considerando a **Resolução CFM n. 1605/2000**, que trata que o médico não pode, sem o consentimento do paciente, revelar o conteúdo do prontuário ou ficha médica, é **CORRETO** afirmar:

- A. () Na investigação da hipótese de cometimento de crime o médico está autorizado a revelar segredo que possa expor o paciente a processo criminal.
- B. () O médico deverá fornecer cópia da ficha ou do prontuário médico desde que solicitado pelo paciente ou requisitado pelos Conselhos Federal ou Regional de Medicina.
- C. () Nos casos previstos nesta resolução e sempre que houver conflito no tocante à remessa ou não dos documentos à autoridade requisitante, o médico deverá consultar o Conselho de Medicina.
- D. () O médico não pode, sem o consentimento do familiar do paciente, revelar o conteúdo do prontuário ou ficha médica.

17ª QUESTÃO – Considerando o Capítulo VII do **Código de Ética Médica – Resolução CFM n. 2.217/2018**, que trata de Relação entre Médicos, é **CORRETO** afirmar:

- A. () É vedado ao médico utilizar-se de sua posição hierárquica para impedir que seus subordinados atuem dentro dos princípios éticos, exceto em situações que envolvam urgência e emergência médica.
- B. () É permitido ao médico acobertar erro ou conduta antiética de médico.
- C. () É permitido ao médico deixar de denunciar atos que contrariem os postulados éticos à Comissão de Ética da instituição em que exerce seu trabalho profissional e, se necessário, ao Conselho Regional de Medicina.
- D. () É vedado ao médico assumir emprego, cargo ou função para suceder médico demitido ou afastado em represália a atitude de defesa de movimentos legítimos da categoria ou da aplicação desse Código.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

18ª QUESTÃO – Em relação ao processo de cicatrização, marque a alternativa **CORRETA**:

- A. () Drogas como a D-penicilamina e o alfa cetoglutarato interferem na hidroxilação da prolina e na polimerização do colágeno, levando a consequente fragilidade cicatricial.
- B. () A força tênsil da cicatriz aumenta rapidamente entre e a primeira e a sexta semanas do processo de cicatrização e, normalmente, supera a força tênsil da pele ilesa.
- C. () O ácido ascórbico é importante para a hidroxilação da prolina em hidroxiprolina e sua deficiência prejudica a síntese colágena, levando a uma cicatrização deficiente.
- D. () Na fase de remodelação, passa a predominar na cicatriz o colágeno tipos II e III (80% e 20%, respectivamente).

19ª QUESTÃO – Em relação aos tipos de cicatrização, marque a alternativa **INCORRETA**:

- A. () Na cicatrização por primeira intenção, a superfície da ferida é minimizada, proporcionando uma epitelização mais rápida e uma menor produção de colágeno, resultando em uma cicatriz mais fina e de melhor qualidade estética.
- B. () Na cicatrização por primeira intenção tardia, as bordas da ferida são aproximadas após alguns dias da lesão e a postergação do fechamento da ferida proporciona uma melhor limpeza local, tanto pelos cuidados médicos como pela ação dos neutrófilos.
- C. () Na cicatrização de feridas de espessura parcial, em que há derme íntegra ao fundo da lesão, a ferida cicatriza por reepitelização a partir dos apêndices dérmicos.
- D. () Na cicatrização por terceira intenção, a ferida é mantida aberta e o seu fechamento ocorre naturalmente pela ação dos miofibroblastos.

20ª QUESTÃO – Em relação aos quelóides e às cicatrizes hipertróficas, analise as assertivas abaixo:

- I - As cicatrizes hipertróficas são elevadas, mas não ultrapassam os limites das lesões que as originaram.
- II - As cicatrizes hipertróficas e os quelóides não apresentam tendência a regressão.
- III - Do ponto de vista imuno-histoquímico, uma diferença marcante entre quelóides e cicatrizes hipertróficas é a predominância de miofibroblastos nos quelóides.
- IV - Os quelóides podem aparecer espontaneamente, sem lesão cutânea prévia.

Estão **CORRETAS** as assertivas:

- A. () I, III e IV, apenas.
- B. () I e IV, apenas.
- C. () II e III, apenas.
- D. () Todas as assertivas estão corretas.

21ª QUESTÃO – Os curativos (coberturas) são importantes recursos para o tratamento de feridas. Sobre os diferentes tipos de curativos (coberturas), marque a alternativa **INCORRETA**:

- A. () Os curativos de hidrogel propiciam umidificação do leito da ferida e favorecem o desbridamento autolítico.
- B. () Nos curativos impregnados com prata, esta é ionizada no ambiente úmido da ferida, apresentando ação bactericida.
- C. () Os curativos de alginato têm alta capacidade de absorção de exsudato e protegem contra o desbridamento autolítico.
- D. () Os curativos de terapia por pressão negativa (subatmosférica) podem ser úteis no tratamento de grandes feridas, reduzindo suas dimensões e melhorando as condições locais para reconstrução posterior.

22ª QUESTÃO – Sobre a abordagem das lesões pigmentadas de pele, assinale a alternativa **CORRETA**:

- A. () Lesões pigmentadas clinicamente suspeitas de malignidade têm a recomendação, como rotina para a abordagem inicial, de realização de biópsia incisional.
- B. () Melanomas invasivos com espessura de Breslow menor que 1mm têm recomendação de ressecção com margens de segurança de 1cm.
- C. () Indica-se a pesquisa do linfonodo sentinela para melanomas com espessura de Breslow maior que 4mm e presença de linfonodo clinicamente positivo.
- D. () O melanoma juvenil, também conhecido como nevo de Spitz, quando diagnosticado por exame histopatológico a partir de biópsia excisional, tem indicação de ampliação cirúrgica com margens de segurança conforme a espessura de Breslow.

23ª QUESTÃO – Sobre os tumores malignos de pele, é **CORRETO** afirmar:

- A. () Os carcinomas de células de Merkel são localmente agressivos, mas raramente apresentam disseminação linfonodal ou a distância.
- B. () O carcinoma sebáceo em associação a um tumor maligno visceral caracteriza a síndrome de Muir-Torre, que apresenta herança autossômica recessiva.
- C. () O dermatofibrossarcoma protuberans é mais comum na região da cabeça e apresenta altas taxas de recidiva e de metástases a distância.
- D. () Os carcinomas sebáceos periorbitais são mais comuns que os extra-orbitais e geralmente tem comportamento agressivo.

24ª QUESTÃO – Em relação aos melanomas cutâneos, assinale a alternativa **INCORRETA**:

- A. () São raros em pessoas negras e, quando nestas ocorrem, são mais frequentes em áreas sujeitas a maior exposição solar e de maior pigmentação.
- B. () A ocorrência de queimaduras solares com formação de bolhas na infância está associada a aumento do risco de desenvolvimento de melanoma ao longo da vida.
- C. () Um número significativo dos melanomas aparece em locais menos expostos ao sol.
- D. () História familiar positiva para melanoma pode ser encontrada em cerca de 10% dos casos.

25ª QUESTÃO – Em relação às fissuras craniofaciais, levando-se em consideração a classificação de Tessier, assinale a alternativa **CORRETA**:

- A. () A fissura número 14 corresponde a extensão cranial da fissura número 1.
- B. () A síndrome de Treacher-Collins é caracterizada bilateralmente pela associação das fissuras de números 6, 7 e 18.
- C. () A fissura número 4 não atinge o sistema lacrimal.
- D. () A fissuras de números 9 e 11 são as mais comuns.

26ª QUESTÃO – Em relação às técnicas cirúrgicas utilizadas no tratamento das fissuras labiais unilaterais, analise as assertivas abaixo:

- I. A técnica de LeMesurier é baseada na formação de retalhos quadrangulares e tem como vantagem a facilidade de revisão da cicatriz resultante, uma vez que esta é linear.
- II. A técnica de Tennison utiliza retalhos triangulares e apresenta como desvantagem uma cicatriz resultante que cruza a crista filtral, tornando-a mais aparente e de revisão mais difícil.
- III. A técnica de Rose-Thompson consiste basicamente em incisar as bordas com um traçado de convexidade voltada para a fissura.
- IV. A técnica de Millard é baseada na rotação e no avanço de retalhos.

Estão **CORRETAS** as assertivas:

- A. () I e IV, apenas.
- B. () I, III e IV, apenas.
- C. () II e IV apenas.
- D. () Todas as assertivas estão corretas.

27ª QUESTÃO – Em relação às ginecomastias, levando-se em consideração a classificação de Simon, assinale a alternativa **INCORRETA**:

- A. () O tipo IV corresponde à pseudoginecomastia.
- B. () Os tipos I e IIA são mais comuns na adolescência e geralmente envolvem espontaneamente.
- C. () O tipo I é o mais comum.
- D. () Os tipos IIB e III geralmente correspondem a ginecomastias de longa duração ou quando há grande redução ponderal.

28ª QUESTÃO – Sobre as técnicas de mamoplastia redutora, enumere a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, ao final, responda o que se pede.

- | | |
|---|----------------|
| 1. Complexo areolo-papilar em retalho bipediculado de orientação transversal. | () McKissock. |
| 2. Complexo areolo-papilar em retalho monopediculado supero-lateral. | () Thorek. |
| 3. Complexo areolo-papilar em retalho bipediculado de orientação vertical. | () Skoog. |
| 4. Enxerto de complexo areolo-papilar | () Strömbeck. |

Marque a alternativa que contém a sequência **CORRETA** de respostas, na ordem de cima para baixo:

- A. () 2, 3, 1, 4.
- B. () 3, 4, 2, 1.
- C. () 4, 1, 2, 3.
- D. () 1, 4, 2, 3.

29ª QUESTÃO – Com relação a ptose mamária, considerando a classificação de Regnault, assinale a alternativa **INCORRETA**:

- A. () Na ptose grau II, a papila encontra-se abaixo do nível do sulco mamário, mas acima do contorno mamário inferior.
- B. () Na ptose grau I, a papila ainda situa-se superiormente ao sulco mamário.
- C. () Na ptose grau III, a papila encontra-se abaixo do nível do sulco mamário e no nível do contorno mamário inferior.
- D. () Na pseudoptose, sem ptose verdadeira, há queda do polo inferior da mama e a papila está posicionada acima do nível do sulco mamário.

30ª QUESTÃO – Sobre o tratamento cirúrgico das úlceras de pressão, assinale a alternativa **INCORRETA**:

- A. () Retalhos miocutâneos podem fornecer boa cobertura e preenchimento, mas podem levar a prejuízo funcional em pacientes que deambulam.
- B. () Retalhos fasciocutâneos oferecem uma cobertura durável com mínimo potencial de prejuízo funcional e permitem uma reconstrução mais próxima da anatomia normal sobre as proeminências ósseas.
- C. () Devido às altas taxas de recorrência das úlceras de pressão, o planejamento dos retalhos deve idealmente possibilitar cobertura adequada, mas sem impedir o uso de outros retalhos no futuro.
- D. () A técnica de primeira escolha é a sutura primária da úlcera.

31ª QUESTÃO – O retalho do tensor da fáscia lata pode ser usado para a reconstrução de defeitos gerados por úlceras de pressão. Sobre este retalho, assinale a alternativa **INCORRETA**:

- A. () Sua porção distal tem boa espessura e nutrição confiável, permitindo que seja a melhor escolha para o fechamento de úlceras isquiáticas.
- B. () O tensor da fáscia lata é do tipo I da classificação de Mathes e Nahai.
- C. () A artéria de seu pedículo dominante é ramo da artéria femoral circunflexa lateral.
- D. () A morbidade da área doadora é relativamente baixa e o retalho pode permitir sensibilidade em algumas circunstâncias.

32ª QUESTÃO – Em relação à anatomia cirúrgica da mão, marque a alternativa **CORRETA**:

- A. () O retináculo flexor (ou ligamento transverso do carpo) se estende do osso pisiforme ao hâmulos do hamato lateralmente e da tuberosidade do escafoide e do trapézio medialmente.
- B. () A polia A1, polia mais proximal, ancora-se na articulação metacarpofalangeana proximal do dedo da mão.
- C. () A polia A2, a maior das polias, estende-se na metade proximal da falange proximal.
- D. () As polias A3 e A5 são as polias cruciais para prevenir o fenômeno “corda de arco”, por serem mais espessas, mais longas e situarem-se em áreas mais críticas para esta função.

33ª QUESTÃO – Em relação ao retalho sural reverso, assinale a alternativa **INCORRETA**:

- A. () Pode ser usado para a reconstrução de defeitos situados no dorso do pé, na região posterior do calcâneo, na região anterior do terço inferior da perna e nas regiões anterior e lateral do tornozelo.
- B. () O principal ponto pivô do seu pedículo está situado aproximadamente a 5 cm proximalmente ao maléolo lateral.

- C. () A relação do comprimento para a largura do pedículo do retalho não deve ser maior do que 4:1.
- D. () O pedículo do retalho deve incluir a veia safena menor, a artéria sural superficial mediana e o nervo safeno.

34ª QUESTÃO – Sobre o teste de Froment, marque a alternativa **CORRETA**:

- A. () Teste para avaliação do nervo radial.
- B. () Realizado com o paciente segurando uma folha de papel entre a ponta ulnar do polegar e a ponta radial do dedo indicador.
- C. () Teste alterado quando o paciente mantém a articulação interfalângiana do polegar estendida.
- D. () Teste normal quando o paciente segura o papel com flexão da articulação interfalângiana do polegar.

35ª QUESTÃO – São vantagens da reconstrução de mama com expansores teciduais, **EXCETO**:

- A. () Não desenvolve ptose mamária com o avançar da idade em relação a mama contralateral.
- B. () Redução da morbidade.
- C. () Diminuição do tempo operatório.
- D. () Manutenção do espaço mamário caso seja realizado um retalho num segundo tempo de reconstrução.

36ª QUESTÃO – Sobre a síndrome de Mondor, marque a alternativa **INCORRETA**:

- A. () É uma tromboflebite superficial da mama.
- B. () Afeta geralmente as veias da porção inferior da mama e ocorre mais frequentemente quando a via de acesso da mamoplastia de aumento é no sulco inframamário.
- C. () Ocorre em 10 a 15% dos casos de cirurgia de aumento mamário.
- D. () Trata-se de processo autolimitado, de tratamento conservador e sintomático.

37ª QUESTÃO – Sobre os planos da face, marque a alternativa **INCORRETA**:

- A. () A camada fascial superficial é formada pelo plastisma, pelo SMAS, pela fascia temporoparietal e pela gálea aponeurótica.
- B. () A camada fascial superficial está situada acima dos músculos frontal, dos músculos do terço médio facial e do platisma.
- C. () A camada fascial profunda está situada acima dos músculos da mastigação, glândula salivar e as principais estruturas neurovasculares.
- D. () A camada fascial profunda é composta pela fascia cervical profunda, pela fascia parotídea-massetérica, pela fascia temporal profunda e pelo periósteo.

38ª QUESTÃO – Sobre a reconstrução de nariz, marque a alternativa **INCORRETA**:

- A. () Nem sempre o defeito reflete o que foi perdido e o que precisa ser reparado.
- B. () O uso de expensor de tecido rotineiro é desnecessário e deve ser usado somente se for contribuir para a reconstrução nasal em geral.
- C. () Com frequência é útil alterar o defeito inicial e descartar pele em excesso antes da reconstrução, mesmo que isso torne o defeito maior.
- D. () A transferência de tecido extra para o defeito previne complicações e evita necessidade de procedimentos adicionais.

39ª QUESTÃO – Sobre os defeitos da orelha e suas reconstruções, marque a alternativa **INCORRETA**:

- A. () As cartilagens costais geralmente são obtidas do lado contralateral da orelha a ser reconstruída ao nível da 8ª e 9ª costelas.
- B. () Criptotia é uma deformidade congênita em que a cartilagem do polo superior da orelha encontra-se embaixo da pele do couro cabeludo, com ausência do sulco aurículo-cefálico.
- C. () A reconstrução da anti-hélice descrita por Mustardé envolve apenas a sutura da cartilagem sem necessidade de incisões na mesma.
- D. () O tecido auricular parcialmente avulsionado pode ser recolocado com sucesso, mesmo que o pedículo remanescente seja pequeno, uma vez que a orelha é altamente vascularizada por toda sua periferia.

40ª QUESTÃO – Sobre reconstrução dos lábios, marque a alternativa **INCORRETA**:

- A. () A interrupção da linearidade de uma incisão que cruza a linha do vermelhão, por meio da confecção de uma “quebra” ou “degrau”, previne a contração da cicatriz, torna o reparo mais fácil e minimiza o risco de cicatriz mais aparente.
- B. () Para pequenos defeitos de espessura total, a ressecção em cunha com forma de “V” permite fechamento de defeito menores, enquanto uma “W-plastia” colocada na base da ressecção facilita o fechamento de defeitos maiores.
- C. () O maior objetivo da reconstrução do lábio é manter a abertura oral adequada.
- D. () O retalho de Abbé pode ser usado para reconstrução de defeito medial ou lateral dos lábios e não precisa ter a mesma largura do defeito (pode ser menor). Porém, precisa ter a mesma altura do defeito e o pedículo do retalho deve ser posicionado no centro do defeito.

-----corte aqui-----

RASCUNHO DO GABARITO

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40