

**PROCESSO DE SELEÇÃO PÚBLICA PARA ADMISSÃO AOS  
PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DA  
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, PARA O ANO DE 2012.**

**RESIDÊNCIA MÉDICA – 2012  
ESPECIALIDADES: CLÍNICA MÉDICA, PEDIATRIA,  
CIRURGIA GERAL E DERMATOLOGIA.**

(Edital DRH/CRS nº 09/2011, de 01 de outubro de 2011)  
Conteúdo - Clínica Médica, Obstetrícia e Ginecologia, Cirurgia Geral, Pediatria e Medicina  
Preventiva e Social.

NOME: \_\_\_\_\_

LOCAL DE PROVA: \_\_\_\_\_ SALA: \_\_\_\_\_

**INSTRUÇÕES AOS CANDIDATOS:**

1. Abra este caderno de prova somente quando autorizado.
2. Esta prova contém 40 (quarenta) questões, valendo 2,25 (dois vírgula vinte e cinco) pontos cada e valor total de 90 (noventa) pontos.
3. O tempo máximo permitido para a realização da prova objetiva será de 180 (cento e oitenta) minutos incluindo o preenchimento da folha de respostas.
4. Responda as questões e marque a opção desejada na folha de respostas, usando caneta (tinta azul ou preta).
5. Para cada questão existe somente uma resposta correta.
6. Prova sem consulta.
7. Não será admitido nenhum tipo de rasura na folha de respostas. As questões rasuradas ou em branco ou com dupla marcação serão consideradas nulas para o candidato.
8. É proibido o uso de máquinas calculadoras, telefones celulares ou outros similares.
9. Iniciadas as provas, os candidatos somente poderão deixar a sala, e a esta retornar, exclusivamente para uso de sanitários ou bebedouros.
10. Ao final de cada prova, entregue ao aplicador a folha de respostas da prova objetiva e a folha de redação, devidamente preenchidas, assinadas e conferidas.

## CLÍNICA MÉDICA

**1ª QUESTÃO** – Em relação ao H. PYLORI marque a alternativa INCORRETA:

- A. ( ) Anormalidades na secreção ácida estomacal estão relacionados à infecção por H. PYLORI.
- B. ( ) O H. PYLORI é responsável por menos de 50% das úlceras gástricas.
- C. ( ) O H. PYLORI está associado à maioria das gastrites crônicas antrais e sua erradicação contribui para o desaparecimento das mesmas.
- D. ( ) A erradicação do H. PYLORI promove a resolução do quadro de duodenite, mas os estudos não demonstram redução na extensão da metaplasia gástrica.

**2ª QUESTÃO** – Em relação às hemorragias digestivas marque a alternativa CORRETA:

- A. ( ) Melena indica que o sangue está presente no trato gastrointestinal por pelo menos 14 horas, e tanto tempo quanto 3 a 5 dias.
- B. ( ) Há nítida vantagem da escleroterapia em relação à ligadura elástica para o tratamento endoscópico dos sangramentos por varizes de esôfago.
- C. ( ) A hematoquezia, quando sinal de uma hemorragia alta, geralmente aparece como quadro crônico e oligossintomático.
- D. ( ) As gastropatias hemorrágicas e erosivas (frequentemente chamadas de gastrites) caracterizam-se por lesões de mucosa, e quando sangram, frequentemente levam às repercussões do estado circulatório do paciente (como taquicardia e hipotensão arterial sistêmica).

**3ª QUESTÃO** – Assinale “C” para as afirmativas CORRETAS e “E” para as ERRADAS e, a seguir, marque a alternativa de resposta CORRETA:

- ( ) O sangue flui de forma contínua das grandes veias para os átrios; cerca de 75% do sangue flui diretamente dos átrios para os ventrículos, mesmo antes que os átrios se contraíam. A contração atrial gera um enchimento adicional dos ventrículos com cerca de 25% do fluxo.
- ( ) O que diferencia a angina pectoris verdadeira da pericardite aguda é que a dor dessa última não se altera com o esforço físico, exacerbando-se com a inspiração profunda e mudança para decúbito dorsal, com grande alívio em posição genupeitoral semiflexionada no chão (“Prece Maometana”).
- ( ) Com relação à diarreia aguda, quadro clínico de fezes volumosas, dor abdominal superior e cólicas sugere acometimento do intestino delgado, enquanto inúmeras evacuações de pequena quantidade, urgência fecal, tenesmo e disenteria sugerem acometimento colônico.
- ( ) Achado de aranha vascular, eritema palmar, ascite, atrofia muscular, ginecomastia, unhas brancas ou em vidro de relógio, justificam exploração funcional do fígado.
- ( ) A fosfatase alcalina corresponde a um conjunto de enzimas intracelulares, que aparecem em muitos tecidos do organismo, bem como a gamaglutamiltransferase (porem esta não existe no tecido ósseo).
- ( ) O acometimento renal na artrite reumatóide costuma decorrer da medicação ou da amiloidose secundária. A existência de uma verdadeira glomerulite reumatóide é questionável.
- ( ) Medicamentos lipossolúveis passam facilmente da corrente sanguínea para o sistema nervoso central, porém outros mais polares não passam, ou o fazem lentamente.

- A. ( ) Uma afirmativa é incorreta.
- B. ( ) Duas afirmativas são incorretas.
- C. ( ) Todas as afirmativas são corretas.
- D. ( ) Três afirmativas são incorretas.

**4ª QUESTÃO** – Com relação ao *Delirium* marque a alternativa CORRETA:

- I - É um transtorno transitório e benigno e não altera o prognóstico do paciente.
- II - Pode ser a única manifestação de doenças potencialmente fatais.
- III - Apresenta flutuações da cognição no período de horas ou dias.
- IV - O diagnóstico de *Delirium* é feito através de exames laboratoriais, culturas, sendo necessário em alguns casos a realização de Tomografia Computadorizada de Crânio.
- V - A fisiopatologia do *Delirium* provavelmente está relacionada a depleção de Dopamina e elevação dos níveis de acetilcolina.
- VI - O tratamento consiste na abordagem dos sintomas neuropsiquiátricos com drogas antipsicóticas.

- A. ( ) Todas as alternativas são falsas.
- B. ( ) Apenas uma afirmativa é verdadeira.
- C. ( ) As afirmativas II, V e VI são verdadeiras.
- D. ( ) As alternativas II e III são verdadeiras.

**5ª QUESTÃO** – Com relação às demências marque a alternativa INCORRETA.

- A. ( ) O diagnóstico da Demência por Corpos de Lewy é sugerido pela presença de Parkinsonismo que antecede o déficit cognitivo, alucinações visuais, distúrbios do sono REM e hipersensibilidade à neurolepticos.
- B. ( ) Na Doença de Alzheimer, o déficit de memória é precoce, ao contrário da Demência Frontotemporal, na qual os pacientes tem maior probabilidade de iniciar o quadro com alterações do humor, comportamento e julgamento.
- C. ( ) A presença do gen alelo Apo ε4 aumenta a chance do indivíduo com Declínio Cognitivo Leve evoluir para Doença de Alzheimer.
- D. ( ) Diabetes melitus, dislipidemia, hiperhomocisteinemia, sedentarismo são fatores de risco tanto para Demência Vascular quanto para Doença de Alzheimer.

**6ª QUESTÃO** – Complete as lacunas do texto abaixo e, a seguir, marque a alternativa que contém a seqüência de palavras CORRETA:

O território cerebral irrigado pelas artérias \_\_\_\_\_ corresponde a cerca de 2/3 \_\_\_\_\_ do encéfalo, sendo um acidente vascular potencial causador de hemiparesia e \_\_\_\_\_. Já o território cerebral irrigado pelas artérias \_\_\_\_\_ corresponde a cerca de 1/3 \_\_\_\_\_ do encéfalo, sendo um acidente vascular potencial causador de \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_.

- A. ( ) Vertebrobasilares; anteriores; ataxia; carótidas; posterior; disfasia; disfagia; vertigem.
- B. ( ) Carótidas; anteriores; disfagia; vertebrobasilares; posterior; disfasia; vertigem; ataxia.
- C. ( ) Carótidas; anteriores; disfasia; vertebrobasilares; posterior; disfagia; ataxia; vertigem.

D. ( ) Vertebrobasilares posteriores; vertigem; carótidas anterior; disfagia; disfasia; ataxia.

**7ª QUESTÃO** – Correlacione os nervos cranianos e respectiva função ou achado em sua disfunção e marque a alternativa que contém a seqüência CORRETA:

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| I - olfatório              | a- motricidade do esternocleidomastóideo                   |
| II - óptico                | b- paralisia do músculo ocular reto lateral                |
| III - oculomotor           | c- anosmia   |
| IV - troclear .....        | d- inervação sensitiva 1/3 posterior da língua             |
| V - trigêmeo .....         | e- motricidade da faringe                                  |
| VI - abducente             | f- acusia  |
| VII - facial               | g- motricidade da língua                                   |
| VIII - auditivo/vestibular | h- anormalidade do campo visual                            |
| IX - glossofaríngeo        | i- midríase e ptose palpebral                              |
| X - vago                   | j- paralisia do músculo oblíquo superior com diplopia      |
| XI - acessório             | l- paralisia da musculatura mímica                         |
| XII - hipoglosso           | m- perda da sensibilidade da face e mastigação deficiente. |

- A. ( ) X a; I b; IV c; V d; VIII e; IX f; II g; XI h; VI i; VII j; XII l; III m.  
B. ( ) XI a. VI b; I c; IX d; X e; VIII f; XII g; II h; III i; IV j; VII l; V m.  
C. ( ) X a; V b; I c; VI d; VII e; XI f; II g; III h; IX i; XII j; VIII l; IV m.  
D. ( ) VII a; VI b; II c; IV d; I e; III f; VIII g; X h; V i; IX j; XII l; XI m.

**8ª QUESTÃO** – Em relação às ascites, marque a alternativa CORRETA:

- A. ( ) O hipotireoidismo grave é uma das causas mais comuns de ascite não cirrótica.  
B. ( ) A principal importância do gradiente de albumina ascite-soro é distinguir ascites infecciosas de não infecciosas.  
C. ( ) O gradiente de albumina ascite-soro < 1.1 g/dL é tipicamente encontrado nas ascites com peritonites tuberculosas, na carcinomatose peritoneal e na ascite pancreática, quando não há hipertensão portal.  
D. ( ) A paracentese é um procedimento seguro até mesmo em pacientes com coagulopatias; complicações como hematomas de parede, hipotensão, síndrome hepatorenal e infecção são infrequentes.

## GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA

**9ª QUESTÃO** – Marque a alternativa CORRETA. A artéria uterina é, na maioria das vezes, ramo da artéria:

- A. ( ) Ilíaca interna.  
B. ( ) Renal.  
C. ( ) Vesical superior.  
D. ( ) Femoral.

**10ª QUESTÃO** – Marque a alternativa CORRETA. Os tipos de HPV mais comuns no câncer de colo uterino são:

- A. ( ) 11 e 14
- B. ( ) 26 e 28
- C. ( ) 16 e 18
- D. ( ) 37 e 38

**11ª QUESTÃO** – Marque a alternativa CORRETA. Pacientes com amenorréia primária e hipogonadismo hipergonadotrófico necessitam de tratamento com:

- A. ( ) Androstenediona.
- B. ( ) Estrogênio e progestogênio.
- C. ( ) Testosterona.
- D. ( ) Dehidroepiandrosterona.

**12ª QUESTÃO** – Marque a alternativa CORRETA. Podem ser considerados como a primeira escolha para o tratamento da endometriose:

- A. ( ) Os androgênios.
- B. ( ) Os estrogênios.
- C. ( ) Os hormônios tireoidianos.
- D. ( ) Os progestogênios .

**13ª QUESTÃO** – Marque a alternativa CORRETA. A rotura prematura das membranas responde por:

- A. ( ) Um terço dos nascimentos pré-termo.
- B. ( ) Metade dos nascimentos pré-termo.
- C. ( ) Dois terços dos nascimentos pré-termo.
- D. ( ) Um quinto dos nascimentos pré-termo.

**14ª QUESTÃO** – Nas gestações gemelares é CORRETO afirmar que:

- A. ( ) Dois terços são gêmeos homozigóticos.
- B. ( ) Metade são gêmeos homozigóticos.
- C. ( ) Um terço são gêmeos homozigóticos.
- D. ( ) Um quinto são gêmeos homozigóticos.

**15ª QUESTÃO** – Marque a alternativa CORRETA. É usado como critério para diagnóstico da pré-eclampsia:

- A. ( ) Pressão arterial sistólica superior a 140 mmHg e diastólica superior a 90 mmHg, após 12 semanas de gestação.
- B. ( ) Pressão arterial sistólica superior a 140 mmHg e diastólica superior a 90 mmHg, após 20 semanas de gestação, em mulheres previamente normotensas.
- C. ( ) Pressão arterial sistólica superior a 130 mmHg e diastólica superior a 90 mmHg, após 16 semanas de gestação.
- D. ( ) Pressão arterial sistólica superior a 120 mmHg e diastólica superior a 80 mmHg, após 28 semanas de gestação, em mulheres previamente normotensas.

**16ª QUESTÃO** – Marque a alternativa CORRETA. Para o tratamento da infecção por *Chlamydia trachomatis* durante a gravidez é preciso usar:

- A. ( ) Gentamicina ou tobramicina.
- B. ( ) Amicacina ou ciprofloxacina.
- C. ( ) Levofloxacina ou tetraciclina.
- D. ( ) Azitromicina ou eritromicina.

### CIRURGIA GERAL

**17ª QUESTÃO** – Marque a alternativa CORRETA. Paciente vítima de acidente automobilístico chega ao pronto socorro trazido pelo resgate, com imobilização adequada, oxigênio suplementar por máscara facial e dois acessos venosos periféricos calibrosos. Ele apresenta trauma grave de face, com sangramento oral e nasal abundantes. O paciente está torporoso, dispnéico, sons pulmonares bastante diminuídos bilateralmente, saturação de oxigênio=60%, FC=155, PA=140/90mmHg. A conduta imediata é:

- A. ( ) Cricotireoidostomia por punção.
- B. ( ) Entubação orotraqueal.
- C. ( ) Traqueostomia de emergência.
- D. ( ) Punção torácica bilateral com agulha calibrosa.

**18ª QUESTÃO** – Gestante de 16 semanas, sem comorbidades, com quadro de dor em epigástrio e hipocôndrio direito com três dias de evolução, sem melhora com analgésicos orais. Sem outras queixas. Ao exame físico apresenta-se anictérica, corada e hidratada. PA=130/80mmHg; FC=92. Ausculta pulmonar sem alterações. Palpação do abdome revelou dor e defesa voluntária em hipocôndrio direito e epigástrio. Exames: Hg=11; Leucócitos=12800; Lipase=28; Bilirrubinas=2,0 (D=1,2; I=0,8); urina rotina: sem alterações. US abdome: vesícula biliar distendida, com paredes medindo 7mm de espessura, e pequena quantidade de líquido peri-vesicular; imagem ecogênica de 2cm em seu interior, fixa no infundíbulo, causando sombra acústica posterior; não há dilatação das vias biliares; a avaliação fetal é normal. A conduta CORRETA é:

- A. ( ) Antibioticoterapia.
- B. ( ) Colangiopancreatografia endoscópica retrógrada + antibioticoterapia.
- C. ( ) Colangiopancreatografia endoscópica retrógrada + colecistectomia + antibioticoterapia.
- D. ( ) Colecistectomia + antibioticoterapia.

**19ª QUESTÃO** Em relação às infecções bacterianas da pele e do tecido celular subcutâneo, marque a alternativa CORRETA:

- A. ( ) Deve-se aguardar a flutuação dos abscessos perianais antes de drená-los.
- B. ( ) No furúnculo, a drenagem não é necessária na maioria dos casos.
- C. ( ) No fleimão, a antibioticoterapia exclusiva é suficiente na maioria dos casos.
- D. ( ) O desbridamento químico pode substituir desbridamento cirúrgico nos casos de infecções com tecidos desvitalizados.

**20ª QUESTÃO** – Em relação à anatomia cirúrgica da região inguino-crural, marque a alternativa CORRETA:

- A. ( ) O nervo ílio-inguinal é identificado após abertura das fáscias do funículo espermático.
- B. ( ) O canal femoral, sede das hérnias femorais, localiza-se lateralmente aos vasos femorais.
- C. ( ) Os vasos epigástricos inferiores situam-se atrás do canal inguinal e podem ser lesados durante as herniorrafias.
- D. ( ) O ligamento inguinal é formado pela borda inferior do músculo transverso do abdome.

**21ª QUESTÃO** – Em relação à hemotransfusão no paciente cirúrgico, marque a alternativa CORRETA:

- A. ( ) A transfusão de plasma está indicada em pacientes usuários de varfarina sódica e que irão ser submetidos à cirurgia de urgência.
- B. ( ) A transfusão do concentrado de hemácias deve basear-se, principalmente, nos índices hematimétricos.
- C. ( ) A transfusão de plaquetas está indicada quando a contagem de plaquetas está abaixo de  $80.000\text{mm}^3$ .
- D. ( ) Quando indicada, deve-se evitar a transfusão de apenas uma unidade de hemácias, pois geralmente são necessárias duas unidades para se ter algum benefício clínico.

**22ª QUESTÃO** – Em relação ao adenocarcinoma ductal do pâncreas, marque a alternativa CORRETA:

- A. ( ) Quando na cabeça do pâncreas, os principais sintomas são perda ponderal e icterícia dolorosa.
- B. ( ) Nas lesões ressecáveis, a biopsia pré-operatória é mandatória para confirmação diagnóstica.
- C. ( ) São critérios de irressecabilidade e/ou inoperabilidade a recusa do paciente, invasão circunferencial da artéria mesentérica superior, e a presença de metástases à distância.
- D. ( ) As lesões do corpo e cauda têm melhor prognóstico que as lesões da cabeça pancreática.

**23ª QUESTÃO** – Em relação aos tumores hepáticos, marque a alternativa CORRETA:

- A. ( ) Os hemangiomas, mesmo quando assintomáticos, devem ser ressecados devido ao risco de ruptura espontânea.
- B. ( ) As metástases hepáticas têm como principal origem o trato digestório.
- C. ( ) A hiperplasia nodular focal está relacionada com alterações nos exames da função hepática.
- D. ( ) Os níveis de alfa-fetoproteína estão elevados em todos os casos de carcinoma hepatocelular.

**24ª QUESTÃO** – Paciente do sexo masculino, 27 anos de idade, obeso e tabagista, procura o seu auxílio com queixa de pirose pós-alimentar diária, que se agrava durante o decúbito, chegando a acordá-lo durante a noite. Faz uso irregular de antiácidos com melhora temporária dos sintomas. Antecedentes pessoais e familiares irrelevantes. Em relação ao caso clínico, marque a alternativa CORRETA:

- A. ( ) A monitorização do pH esofágico por 24h (pHmetria), padrão-ouro para o diagnóstico do refluxo gastroesofágico, está indicada para confirmação diagnóstica.
- B. ( ) O achado de epitélio colunar na biopsia endoscópica do esôfago distal indica boa evolução e cicatrização da mucosa.
- C. ( ) O tratamento cirúrgico deve ser precocemente indicado devido à gravidade dos sintomas.
- D. ( ) Os antiácidos podem ser usados para alívio dos sintomas nas formas leves da doença, mas não são eficazes na cicatrização da esofagite.

### PEDIATRIA

**25ª QUESTÃO** – Marque a alternativa CORRETA. De acordo com as normas de vacinação do Programa Nacional de Imunização, as vacinas de bactérias ou vírus atenuados são contra-indicadas para crianças:

- A. ( ) Desnutridas.
- B. ( ) Com antecedente familiar de convulsão.
- C. ( ) Com imunodeficiência congênita ou adquirida.
- D. ( ) Portadores de doença neurológica estável.

**26ª QUESTÃO** – Com relação à artrite de febre reumática, marque a alternativa CORRETA:

- A. ( ) Há uma correlação positiva entre a intensidade da dor e a presença de sinais flogísticos.
- B. ( ) É a manifestação mais específica, contudo pouco freqüente.
- C. ( ) Acomete sobretudo pequenas articulações, tem caráter fugaz e auto-limitado.
- D. ( ) Geralmente a resposta aos salicilatos em doses anti-inflamatórias é irregular.

**27ª QUESTÃO** – Sobre o eritema infeccioso é CORRETO afirmar que:

- A. ( ) O agente etiológico é o Togavírus.
- B. ( ) A lesão da pele inicia-se como uma mácula que aumenta de tamanho, deixando a pele central mais pálida, conferindo um aspecto tipicamente rendilhado.
- C. ( ) Apresenta período prodrômico bem caracterizado, marcado com febre alta, mialgias, cefaléia e mal-estar.
- D. ( ) Caracteriza-se por um exantema maculo-papular que via de regra se inicia no tronco.



**28ª QUESTÃO** – Marque a alternativa CORRETA. O sopro cardíaco inocente é um achado freqüente ao exame físico de crianças, sobretudo em idade escolar. É característica do sopro inocente:

- A. ( ) Ser acompanhado de frêmito.
- B. ( ) Apresentar a segunda bulha com desdobramento fixo.
- C. ( ) Apresentar irradiação bem nítida e fixa.
- D. ( ) Ser mais facilmente audível nos estados circulatórios hipercinéticos.

**29ª QUESTÃO** – A púrpura trombocitopênica idiopática – PTI é o distúrbio hemorrágico adquirido mais frequente na faixa etária pediátrica. É CORRETO afirmar que:

- A. ( ) Hemorragia grave de sistema nervoso central é freqüente, daí a necessidade de sempre se internar a criança.
- B. ( ) Geralmente o baço é palpável em 100% dos casos.
- C. ( ) É comum o relato de doença viral recente e pode estar relacionado à vacinação prévia em lactentes abaixo de 2 anos.
- D. ( ) Além da plaquetopenia, o exame laboratorial apresenta leucocitose e anemia, independente de ter ocorrido sangramento.

**30ª QUESTÃO** – Marque a alternativa CORRETA. A bronquiolite aguda é uma infecção do trato respiratório inferior comum em crianças pequenas, em relação a etiopatogenia e diagnóstico tem-se:

- A. ( ) As manifestações clínicas são características e permitem o diagnóstico na maioria dos casos.
- B. ( ) A etiologia bacteriana é a principal causa da doença.
- C. ( ) A displasia broncopulmonar não constitui fator de risco associado a gravidade clínica da doença.
- D. ( ) Nos prematuros raramente ocorre crise de cianose com períodos de apnéia.

**31ª QUESTÃO** – Marque a alternativa CORRETA. O hipotireoidismo congênito primário tem como principal causa:

- A. ( ) Defeitos de síntese dos hormônios tireoidianos.
- B. ( ) Uso materno de medicamentos anti-tireoidianos.
- C. ( ) Defeito genético central - eixo hipotálamo-hipófise.
- D. ( ) Disgenesias Tireoidianas.

**32ª QUESTÃO** – Marque a alternativa CORRETA. O raquitismo carencial (deficiência de vitamina D) cursa com a seguinte alteração laboratorial:

- A. ( ) Calcemia elevada e fosfatemia diminuída.
- B. ( ) Calcemia normal e/ou diminuída.
- C. ( ) Calcemia e fosfatemia elevadas.
- D. ( ) Fosfatase alcalina diminuída.

## MEDICINA PREVENTIVA E SOCIAL

**33ª QUESTÃO** – Marque a alternativa CORRETA para a definição de surto de sarampo:

- A. ( ) Ocorrência de dois ou mais casos suspeitos, numa área geográfica definida, notificados num período de 30 dias, e que tenham uma associação epidemiológica.
- B. ( ) Ocorrência de três ou mais casos suspeitos, em área geográfica definida, notificados num período de 45 dias, e que tenham uma associação epidemiológica.
- C. ( ) Ocorrência de três ou mais casos suspeitos, numa área geográfica definida, notificados num período de 30 dias, e que tenham uma associação epidemiológica.
- D. ( ) Ocorrência de dois ou mais casos suspeitos, em área geográfica definida, notificados num período de 45 dias, e que tenham uma associação epidemiológica.

**34ª QUESTÃO** – Marque a alternativa CORRETA. Não podemos considerar como mais comumente utilizado em saúde pública:

- A. ( ) Índice de prevalência.
- B. ( ) Coeficiente geral de fecundidade.
- C. ( ) Índice vital de Pearl.
- D. ( ) Índice de masculinidade.

**35ª QUESTÃO** – Marque a alternativa CORRETA. Qual é o bioagente associado à patogênese das doenças sexualmente transmissíveis Saúde do Trabalhador?

- A. ( ) *Rickettsia rickettsii*.
- B. ( ) *Flavivírus*.
- C. ( ) *Borrelia recurrentis*.
- D. ( ) *Mycoplasma hominis*.

**36ª QUESTÃO** – Marque a alternativa CORRETA. Não é enquadrado no processo de transmissão por aerossóis primários:

- A. ( ) *Mycobacterium leprae*.
- B. ( ) *Staphylococcus aureus*.
- C. ( ) *Bordetella pertussis*.
- D. ( ) *Neisseria meningitidis*.

**37ª QUESTÃO** – Marque a alternativa CORRETA. A doença que apresenta baixa infectividade, alta patogenicidade e alta virulência é:

- A. ( ) Tétano.
- B. ( ) Difteria.
- C. ( ) Poliomelite.
- D. ( ) Tracoma.

**38ª QUESTÃO** – Marque a alternativa CORRETA. A sequência correta para investigação de uma epidemia é:

- 1- Determinação do grupo afetado
- 2- Confirmação da existência de epidemia
- 3- Verificação do diagnóstico
- 4- História epidemiológica individual dos doentes e contatos

- A. ( ) 1-2-3-4.  
B. ( ) 2-3-2-4.  
C. ( ) 3-2-1-4.  
D. ( ) 3-1-2-4.

**39ª QUESTÃO** – Marque a alternativa CORRETA. A vacina cuja via de administração é a subcutânea é:

- A. ( ) DPT.  
B. ( ) TT.  
C. ( ) BCG.  
D. ( ) Anti-sarampo.

**40ª QUESTÃO** – Marque a alternativa CORRETA. O fator de maior risco associado ao câncer de mama é:

- A. ( ) Menarca tardia.  
B. ( ) Nuliparidade.  
C. ( ) Menopausa precoce.  
D. ( ) Uso de anticoncepcional oral.

----- corte aqui-----

**RASCUNHO – GABARITO DO CANDIDATO**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40