



**PROCESSO DE SELEÇÃO PÚBLICA PARA ADMISSÃO AOS PROGRAMAS DE
RESIDÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS,
PARA O ANO DE 2014.**

RESIDÊNCIA MÉDICA/2014

ESPECIALIDADES: CLÍNICA MÉDICA, CIRURGIA GERAL, PEDIATRIA E DERMATOLOGIA

(Edital DRH/CRS nº 09 / 2013, de 02 de outubro de 2013)

Conteúdo: Obstetrícia e Ginecologia, Clínica Médica, Cirurgia Geral, Pediatria
e Medicina Preventiva e Social.

NOME: _____

LOCAL DE PROVA: _____ SALA: _____

DATA: 23/11/2013

INSTRUÇÕES AOS CANDIDATOS

1. Abra este caderno de prova somente quando autorizado.
2. Esta prova contém 40 (quarenta) questões, valendo 2,25 (dois vírgula vinte e cinco) pontos cada e valor total de 90 (noventa) pontos.
3. O tempo máximo permitido para a realização da prova objetiva será de 03 (três) horas incluindo o preenchimento da folha de respostas.
4. Responda as questões e marque a opção desejada na folha de respostas, usando somente caneta na cor azul ou preta.
5. Para cada questão existe somente uma resposta correta.
6. Prova sem consulta.
7. Não será admitido nenhum tipo de rasura na folha de respostas. As questões rasuradas ou em branco ou com dupla marcação serão consideradas nulas para o candidato.
8. É proibido o uso de máquinas calculadoras, telefones celulares ou outros similares.
9. Iniciadas as provas, os candidatos somente poderão deixar a sala, e a esta retornar, exclusivamente para uso de sanitários ou bebedouros.
10. Ao final da prova, entregue ao aplicador a folha de respostas, devidamente preenchida, assinada e conferida, juntamente com o caderno de provas.

OBSTETRÍCIA E GINECOLOGIA

1ª QUESTÃO – Em relação ao trabalho de parto, marque a alternativa CORRETA:

- A. () A analgesia peridural é associada ao prolongamento do segundo período do trabalho de parto.
- B. () Por meio da pelvimetria radiográfica é possível prognosticar o sucesso do parto vaginal em nulíparas.
- C. () A flexão da cabeça fetal torna o parto vaginal impossível a não ser que o mento sofra rotação posterior.
- D. () Mesmo se a cabeça fetal não estiver insinuada poderá ser tentada a rotação com auxílio do fórceps de Piper.

2ª QUESTÃO – Em relação à hipertensão arterial crônica na gravidez, marque a alternativa CORRETA:

- A. () Os inibidores da enzima conversora da angiotensina são considerados como terapia de primeira linha para o tratamento da hipertensão arterial crônica na gravidez.
- B. () A monoterapia com hidralazina oral para hipertensão arterial crônica é recomendada por causa de seus fortes efeitos anti-hipertensivos.
- C. () O uso da alfa-metildopa no primeiro trimestre não foi associado a nenhum padrão de anomalias fetais.
- D. () A administração de diurético tiazídico para mulheres hipertensas crônicas é eficaz para prevenção de pré-eclâmpsia primária.

3ª QUESTÃO – Em relação à cirurgia cesariana, marque a alternativa CORRETA:

- A. () As mulheres com cesariana prévia apresentam taxas mais baixas de ruptura uterina em gestações subsequentes quando comparadas àquelas que tiveram apenas partos vaginais.
- B. () Há maior risco de efeitos adversos respiratórios neonatais quando o procedimento é realizado antes de 39 semanas completas.
- C. () A incisão transversal no segmento inferior do útero descrita por Kerr em 1991 é, também, chamada de incisão clássica.
- D. () A placenta prévia centro total não é indicação absoluta de cesariana em gestações com fetos vivos.

4ª QUESTÃO – Nas assertivas abaixo marque "V" para as verdadeiras e "F" para as falsas e, a seguir, marque a alternativa que contém a sequência de respostas CORRETA em relação à infecção puerperal:

- () Em comparação com a cesariana, a endometrite depois do parto vaginal é relativamente rara.
- () A profilaxia antimicrobiana perioperatória não deve ser recomendada nas cirurgias cesarianas de urgência.
- () As culturas rotineiras das secreções do trato genital, antes de iniciar o tratamento, têm muita importância clínica, pois - frequentemente - orientam a modificação do tratamento proposto inicialmente.
- () O tratamento pré-natal das infecções vaginais assintomáticas evita infecções pélvicas puerperais.

- A. () F, V, V, V.
- B. () V, F, V, V.
- C. () V, F, F, F.
- D. () F, V, F, F.

5ª QUESTÃO – Em relação à gravidez ectópica, marque a alternativa CORRETA:

- A. () A ausência de gravidez uterina à ultrassonografia transvaginal com níveis de b-HCG superiores a 2.000 UI/L significa, invariavelmente, o diagnóstico de gravidez ectópica.
- B. () Em casos de gravidez ectópica, os níveis de β -HCG deverão aumentar, somente, entre 53 a 66% a cada 48 horas.
- C. () O DIU TCU380A não confere um aumento absoluto na taxa de gravidez ectópica.
- D. () Quando apresenta níveis inferiores a 10 ng/ml, a progesterona sérica é um excelente exame para diferenciar a gravidez ectópica da eutópica.

6ª QUESTÃO – A terapia clínica para a gravidez ectópica é a preferida pela maioria dos médicos, se viável. Apenas o metotrexato é amplamente estudado como uma alternativa para a terapia cirúrgica. A melhor candidata para a terapia clínica é a mulher que NÃO apresenta:

- A. () β -HCG inferior a 5.000 UI/L.
- B. () Estabilidade hemodinâmica.
- C. () Gravidez intra-uterina.
- D. () Massa ectópica inferior a 3,5 cm.

7ª QUESTÃO – Em relação à endometriose é CORRETO afirmar que:

- A. () O CA125 é exame de alta sensibilidade na detecção de casos leves de endometriose.
- B. () A laparoscopia é o principal método primário (padrão ouro) para o diagnóstico da endometriose.
- C. () É rara a ocorrência de infertilidade associada à endometriose.
- D. () Os agentes gestacionais são contraindicados no tratamento da endometriose.

8ª QUESTÃO – Nas assertivas abaixo marque "V" para as verdadeiras e "F" para as falsas, e, a seguir, marque a alternativa que contém a sequência de respostas CORRETA em relação ao climatério:

- () A reposição estrogênica não tem eficácia comprovada na prevenção da osteoporose e na redução do risco de fraturas.
- () A histeroscopia é exame pouco útil para avaliar lesões intra-uterinas focais na pós-menopausa.
- () É extremamente recomendado que, em mulheres na pós-menopausa com sangramento anormal, faça-se biópsia endometrial se a espessura do endométrio for inferior a 5 mm, considerando o elevado risco de câncer nessas situações.
- () A terapia hormonal com estrogênio é o tratamento mais eficaz para os fogachos e distúrbios do sono na transição menopáusicas.

- A. () V, F, F, V.
- B. () F, V, V, F.
- C. () V, V, V, F.
- D. () F, F, F, V.

CLÍNICA MÉDICA

9ª QUESTÃO – Marque a alternativa INCORRETA. São preditores de cirrose em adultos com conhecimento ou suspeita de doença hepática:

- A. () Discriminante de Bonacini de cirrose maior que 7.
- B. () Presença de ascite.
- C. () Presença de aranha vascular.
- D. () Contagem de plaquetas menor de 200.000.

10ª QUESTÃO – Marque a alternativa CORRETA. A causa mais comum de febre de origem indeterminada infecciosa é:

- A. () Tuberculose.
- B. () HIV.
- C. () Abscesso.
- D. () Endocardite.

11ª QUESTÃO – Sobre ascite em pacientes com carcinomatose peritoneal de origem neoplásica, marque a alternativa INCORRETA:

- A. () O uso de shunts peritoneo venoso deve ser considerado.
- B. () Todos os pacientes se beneficiam do uso de diuréticos.
- C. () A sensibilidade da citologia oncótica – detecção de malignidade – é alto sendo maior que 50% nos achados.
- D. () O uso de infusão de albumina pós paracentese, não tem encontrado respaldo de literatura médica como rotina.

12ª QUESTÃO – No tocante a hipertensão pulmonar é INCORRETO afirmar que:

- A. () Artrite reumatoide é causa de hipertensão pulmonar por obliteração de leito vascular pulmonar.
- B. () A hipertensão portal é uma das causas de hipertensão pulmonar.
- C. () É caracterizada pela elevação da pressão venosa pulmonar e falha ventricular esquerda.
- D. () HIV é causa rara.

13ª QUESTÃO – Em relação à hiperlipemia, marque a alternativa INCORRETA:

- A. () Em paciente com diabetes mellitus tipo 2, o achado mais comum é hipertrigliceridemia e baixo HDL.
- B. () Hipotireoidismo é causa de hiperlipemia.
- C. () Tabagismo reduz levemente o HDL.
- D. () Alcoolismo excessivo correlaciona-se com elevação do HDL e do LDL, redução VLDL e elevação de triglicérides.

14ª QUESTÃO – Nas afirmativas abaixo, marque “V” para as verdadeiras e “F” para as falsas e, a seguir, marque a alternativa que contém a sequência de respostas CORRETA.

- () Colite fulminante (forma grave de colite por clostridium) pode ser causa de megacolon tóxico e perfuração intestinal. Suspeita clínica quando dor abdominal difusa, diarreia, distensão abdominal, febre, hipovolemia, acidose láctica e leucocitose.
- () Hipertrigliceridemia é a 3ª causa mais prevalente de pancreatite aguda, após álcool e cálculos biliares. O risco de pancreatite inicia-se quando a trigliceridemia supera em torno de 500 mg/dl e torna-se muito aumentado se trigliceridemia maior que 1000 mg/dl. O foco do tratamento é reduzir para menos de 500 mg/dl.
- () Diabetes mellitus mal controlado, alcoolismo, obesidade, gestação, pancreatite prévia e histórico de dislipidemia sugerem diagnóstico de pancreatite secundária a hipertrigliceridemia. Clinicamente, a apresentação da pancreatite é similar às de outras causas.
- () A mielodisplasia é risco para anemia, infecção e sangramento, bem como progressão para leucemia mieloide aguda, geralmente refrataria ao tratamento. A maioria dos pacientes morrem por consequência da insuficiência da medula óssea e não pela transformação leucêmica.
- () Abuso de álcool poderá comprometer a hematopoiese e gerar pancitopenia. A anemia, frequentemente macrocítica, correlaciona-se a desnutrição e deficiência de folato. Trombocitopenia e, principalmente, leucopenia, correlacionam-se mais com hipersplenismo.

- A. () V, F, F, V, V.
- B. () F, F, F, F, F.
- C. () V, V, V, V, V.
- D. () V, V, V, F, F.

15ª QUESTÃO – Marque a alternativa INCORRETA:

- A. () Tomografia computadorizada não é requerida no primeiro dia para diagnóstico de pancreatite aguda. É exame importante em período posterior principalmente na pesquisa de necrose pancreática.
- B. () Fator estimulador de colônia de granulócitos tem bom efeito no tratamento de neutropenia, demonstrando impacto na sobrevida na maioria das situações clínicas.
- C. () Hipertireoidismo subclínico está associado a risco aumentado de fibrilação atrial.
- D. () Hipotireoidismo subclínico pode ser assintomático ou oligossintomático e pode estar associado a maior risco cardiovascular.

16ª QUESTÃO – Marque a alternativa abaixo que NÃO se encontra entre os fatores de pior prognóstico da hipertensão pulmonar:

- A. () Classe funcional II da-WHO (Organização Mundial da Saúde).
- B. () Diabetes.
- C. () Diminuição da capacitância da artéria pulmonar.
- D. () Doença pulmonar obstrutiva crônica.

CIRURGIA GERAL

17ª QUESTÃO – Marque a alternativa CORRETA. A *colangiorressonância* é um exame muito utilizado para diagnóstico das patologias das vias biliares intra e extra-hepáticas. Este exame utiliza como contraste:

- A. () Bile.
- B. () Gadolínio.
- C. () Iodado intravenoso.
- D. () Verde de indocianina.

18ª QUESTÃO – Em relação aos tumores da região cervical, marque a alternativa INCORRETA:

- A. () Os tumores salivares dão metástases para os níveis I e II.
- B. () Os tumores da tireóide podem ser diagnosticados como massas cervicais nos níveis I e II.
- C. () O divertículo de Zenker apresenta-se no nível II como massa de consistência cística.
- D. () Os tumores glômicos fazem parte do diagnóstico diferencial das massas cervicais no nível II.

19ª QUESTÃO – Quanto aos linfomas gástricos MALT, marque a alternativa INCORRETA:

- A. () A translocação é frequente nos linfomas gástricos MALT sendo em muitos casos a única alteração cromossômica detectada.
- B. () O gene supressor de tumor - p53, paradoxalmente encontra-se ativado nos tumores MALT, tanto de baixo grau quanto de alto grau.
- C. () A infecção por H.pylori induz a aquisição de tumores MALT na mucosa gástrica como também promove a malignização de células B reativas.
- D. () O tratamento operatório do tumor MALT oferece sobrevida mais longa, previne recidivas, hemorragias e perfuração, assim como favorece melhor resposta a outras terapias.

20ª QUESTÃO – Marque a alternativa CORRETA. Um paciente adulto recebeu um transplante de fígado devido uma patologia hepática da qual era vítima desde a adolescência. A(s) principal(ais) fixação(ões) desta víscera após o implante é(são):

- A. () Sutura da cápsula de Glisson nas estruturas musculares (pilares diafragmáticos, musculatura dorsal, musculatura paravertebral).
- B. () Anastomose arterial.
- C. () Ligamentos falciforme, triangular e redondo.
- D. () Anastomoses venosas.

21ª QUESTÃO – Em relação à área hepato-bilio-pancreáticas é INCORRETO afirmar que:

- A. () A veia supra-hepática direita se une em tronco único com a veia supra-hepática média e juntas drenam todo o lobo hepático direito, enquanto a veia supra-hepática esquerda drena o lobo esquerdo para a veia cava.
- B. () O fígado pode ter seu suprimento arterial feito por uma artéria hepática média, uma artéria hepática direita, ramo da mesentérica superior, e uma artéria hepática esquerda, ramo da artéria gástrica esquerda.
- C. () Na síndrome de Budd-Chiari não é incomum a hiperfuncionalidade do segmento hepático I pelo fato do mesmo ter conexões venosas próprias com a veia cava abdominal.
- D. () Existe uma maior incidência de malignidades de vias biliares nos portadores de patologias da junção pcreatobiliares.

22ª QUESTÃO – Em relação ao câncer de cólon, marque a alternativa INCORRETA:

- A. () A polipose juvenil é caracterizada por pólipos hamartomatosos, tem transmissão autossômica dominante e representa menos de 1% dos casos de câncer colorretal.
- B. () Na síndrome de Peutz-Jeghers (hamartomas de delgado e manchas melanóticas dos lábios), existe um risco discretamente maior que a população geral ao desenvolvimento do câncer colorretal.
- C. () Pacientes com polipose adenomatosa familiar invariavelmente desenvolvem câncer colorretal entre a 4ª ou 5ª décadas.
- D. () Quando o k-ras é classificado como selvagem, drogas anti-EGFR podem ser combinadas à quimioterapia para aumentar a eficácia do tratamento do câncer colorretal.

23ª QUESTÃO – Em relação aos tumores císticos do pâncreas, marque a alternativa INCORRETA:

- A. () A ecoendoscopia permite estudar a parede do cisto, a presença de microcistos assim como a presença de vegetações dentro do cisto.
- B. () Os tumores intraductais papilares e mucinosos que acometem o canal principal necessitam de tratamento operatório para prevenir o risco de câncer.
- C. () O cistoadenoma seroso não constitui uma indicação válida de seguimento clínico devido a elevada incidência de malignização.
- D. () Cistos com parede espessa que captam contraste ao exame de imagem, com conteúdo líquido heterogêneo, fazem necessário o diagnóstico diferencial com pseudocisto de pâncreas.

24ª QUESTÃO – Quanto a apendicite aguda na gravidez, marque a alternativa INCORRETA:

- A. () A maioria dos casos ocorrem nos dois primeiros trimestres e o diagnóstico da doença vai se tornando mais difícil ao longo da gravidez.
- B. () Devido ao risco de complicações materno-fetais, o esfriamento do processo e o tratamento definitivo no pós-parto imediato é conduta muitas vezes adotada.
- C. () A laparoscopia pode ser usada para tratamento da doença, mas a confecção do pneumoperitôneo e a punção dos trocateres devem se adaptar ao volume uterino.
- D. () É a urgência cirúrgica não obstétrica mais frequente na mulher grávida e a ocorrência de formas complicadas não são raras.

PEDIATRIA

25ª QUESTÃO – Uma criança de 7 (sete) anos apresenta-se na consulta em pronto atendimento com edema bipalpebral de início súbito e relato de urina escura. Medida de PA 120 x 60. O exame de urina mostra hematúria com cilindros hemáticos. Qual a principal hipótese diagnóstica?

- A. () Infecção do trato urinário.
- B. () Síndrome nefrótica.
- C. () Glomerulonefrite difusa aguda.
- D. () Intoxicação medicamentosa.

26ª QUESTÃO – A infecção urinária pode se manifestar de formas distintas na infância. Sobre a infecção urinária é CORRETO afirmar que:

- A. () Disúria em escolares sempre corresponde a infecção urinária.
- B. () A febre é a principal manifestação em lactentes.
- C. () O GRAM de gota não centrifugada com presença de bactérias confirma diagnóstico de infecção urinária.
- D. () A coleta da urina deve ser feita após higiene com uso de antissépticos.

27ª QUESTÃO – Relacione a 2ª coluna com a 1ª coluna e, a seguir, marque a alternativa que contém a sequência de respostas CORRETA.

- | | |
|---------------------|--|
| 1. Sarampo. | () Exantema coincide com desaparecimento da febre. |
| 2. Rubéola. | () Febre, exantema e linfadenomegalia. |
| 3. Varicela. | () Exantema de distribuição centrípeta, lesões papulovesiculares, polimórficas. |
| 4. Exantema Súbito. | () Febre, conjuntivite, sintomas catarrais, exantema morbiliforme. |

- A. () 4, 2, 3, 1.
B. () 3, 4, 2, 1.
C. () 1, 2, 3, 4.
D. () 1, 4, 3, 2.

28ª QUESTÃO – Sobre a Febre Reumática é CORRETO afirmar que:

- A. () É causada pelo estreptococo beta hemolítico do grupo B de Lancifield.
B. () Em casos de Coreia de Sydenhan isolada e tardia não há necessidade de comprovação de estreptococcia prévia.
C. () Atinge preferencialmente menores de 4 (quatro) anos.
D. () Eritema marginado é considerado critério menor.

29ª QUESTÃO – Marque a alternativa CORRETA em relação às meningites bacterianas:

- A. () São características do líquido de meningite bacteriana o aumento de número de células com predomínio de polimorfonucleares e glicorraquia diminuída.
B. () O meningococo é o principal agente etiológico em qualquer faixa etária.
C. () Em crianças com clínica muito sugestiva de infecção do sistema nervoso central o líquido normal afasta definitivamente o diagnóstico.
D. () O uso prévio de antibiótico não altera significativamente a cultura do líquido.

30ª QUESTÃO – Sobre a Doença Falciforme, hemoglobinopatia caracterizada pela presença de hemoglobina S nas hemácias, é CORRETO afirmar que:

- A. () Os pacientes são predispostos a infecções por bactérias não capsuladas por deficiência na opsonização.
B. () Por ser uma anemia hemolítica o número de reticulócitos é aumentado e observa-se hiperbilirrubinemia direta.
C. () A esplenomegalia é comum em qualquer faixa etária nos portadores de hemoglobinopatia SS.
D. () A vacinação deve ser completa inclusive para pneumococo, meningococo e gripe.

31ª QUESTÃO – Sobre a infecção urinária na infância, marque “V” para as assertivas verdadeiras e “F” para as falsas e, a seguir, marque a alternativa que contém a sequência de respostas CORRETA:

- () A infecção do trato urinário pode se manifestar de diversas formas dependendo da idade e da localização da infecção.
- () Em recém-nascidos é comum a queixa de dificuldade de sucção, hipoatividade e vômitos.
- () Em lactentes ocorre predomínio dos sintomas relacionados ao trato urinário.
- () São considerados métodos de coleta de urina: saco coletor, cateterismo vesical e punção supra púbica.

- A. () V, F, V, V.
- B. () V, V, V, V.
- C. () V, V, V, F.
- D. () V, V, F, V.

32ª QUESTÃO – Relacione a 2ª coluna com a 1ª, estabelecendo correlação entre as hipovitaminoses e suas consequências e, a seguir, marque a alternativa que contém a sequência de respostas CORRETA:

- | | |
|------------------|----------------------------|
| 1. Vitamina A. | () Anemia megaloblástica. |
| 2. Vitamina C. | () Escorbuto. |
| 3. Tiamina. | () Cegueira noturna. |
| 4. Niacina. | () Beribéri. |
| 5. Ácido fólico. | () Pelagra. |

- A. () 5, 2, 1, 4, 3.
- B. () 5, 2, 1, 3, 4.
- C. () 5, 3, 1, 2, 4
- D. () 5, 4, 1, 3, 2.

MEDICINA PREVENTIVA E SOCIAL

33ª QUESTÃO – Em relação à Saúde Pública no Brasil-Colônia, marque “V” para as assertivas verdadeiras e “F” para as falsas e, a seguir, marque a alternativa que contém a sequência de respostas CORRETA:

- () Um dos primeiros tuberculosos que por aqui aportou foi o jesuíta Manoel da Nóbrega, que ao realizar sua missão evangelizadora, disseminou o bacilo de Koch entre as populações indígenas.
- () A primeira Santa Casa de Misericórdia no Brasil foi instalada em Salvador, em 1539.
- () O jesuíta José de Anchieta foi tuberculoso.
- () As Santas Casas de Misericórdia desempenharam papel importante no atendimento aos enfermos dos navios e moradores da colônia.
- () A primeira faculdade de Medicina no Brasil foi criada no Rio de Janeiro, por D. João VI, em 1808.

- A. () F, F, F, V, F.
- B. () V, V, F, V, V.
- C. () V, F, V, V, F.
- D. () F, V, V, V, V.

34ª QUESTÃO – Em relação à Saúde Pública na 1ª República do Brasil (entre 1889 e 1930), marque “V” para as assertivas verdadeiras e “F” para as falsas e, a seguir, marque a alternativa que contém a sequência de respostas CORRETA:

- () A maior responsável pelos altos índices de mortalidade no final do século XIX e início do século XX foi a Tuberculose.
- () O Governo Federal conseguiu conter o avanço da Febre Amarela, da Varíola, da Febre Tifóide e da “Peste do Oriente”.
- () Em 1900 foi criada no Rio de Janeiro a “Liga Brasileira contra a Varíola”.
- () A Tuberculose não recebeu dos poderes públicos a assistência adequada para seu controle.
- () A SUCAM (Superintendência de Campanhas) desenvolveu quatro programas de controle de doenças: Chagas, Esquistossomose, Malária e Hanseníase.

- A. () V, F, F, V, F.
- B. () V, V, V, F, F.
- C. () F, F, V, F, V.
- D. () V, V, F, V, F.

35ª QUESTÃO – Marque a alternativa que apresenta a correlação CORRETA:

- A. () Antroponoses: Febre Tifóide e Leishmaniose Tegumentar.
- B. () Zooantroponoses: porcos alimentados com fezes bovinas e equinas contendo ovos de Taenia.
- C. () Anfixenoses: Leishmaniose visceral e doença de Chagas.
- D. () Antropozoonoses: Coqueluche e Brucelose.

36ª QUESTÃO – Marque a alternativa que apresenta a correlação CORRETA:

- A. () Alta Virulência: vírus do Sarampo.
- B. () Baixa Patogenicidade: vírus da Poliomielite.
- C. () Alta Infectividade: Fungos.
- D. () Baixa Virulência: vírus da Raiva.

37ª QUESTÃO – Em relação à Saúde Mental, marque “V” para as assertivas verdadeiras e “F” para as falsas e, a seguir, marque a alternativa que contém a sequência de respostas CORRETA:

- () Os primeiros CAPS no Brasil foram implantados no início da década de 1980, sendo amplamente expandidos no território nacional a partir de 2002.
- () Um dos principais objetivos de um CAPS é oferecer contenção para crises psicológicas/psiquiátricas.
- () O Movimento de Luta Antimanicomial ganhou impulso a partir de 2002, após a sanção da Lei 10.216/2001.
- () Existem CAPS I, II, III (modalidade geral, destinados ao atendimento de pessoas com transtornos mentais), CAPSca (voltado ao atendimento de crianças e adolescentes) e CAPSad (voltado ao atendimento do público usuário de álcool e outras drogas).
- () Uma das metas do governo brasileiro é estimular a reabilitação das pessoas portadoras de transtorno mental, um exemplo é o “Projeto de Volta Pra Casa”.

- A. () F, V, V, F, V.
- B. () V, V, V, V, F.
- C. () V, V, F, V, V.
- D. () F, V, V, F, F.

38ª QUESTÃO – Marque a alternativa que contém a correlação CORRETA entre doenças emergentes e os fatores que contribuíram para o surgimento:

- A. () Síndrome do choque tóxico e tampões ultra-absorventes.
- B. () Febre de Lassa e mudanças no processo de alimentação do gado.
- C. () Influenza e fatores desconhecidos.
- D. () Febre purpúrica brasileira e reflorestamento próximo a casas e outras condições que favorecem o desenvolvimento do vetor.

39ª QUESTÃO – Em relação à Saúde Bucal, marque “V” para as assertivas verdadeiras e “F” para as falsas e, a seguir, marque a alternativa que contém a sequência de respostas CORRETA:

- () Cáries dentais podem ser prevenidas por meio da manutenção de baixos teores de flúor na cavidade oral.
- () A cárie dentária está relacionada com determinantes sócio-culturais, como condições precárias de moradias e a falta de tradições, crenças e cultura que apoiem a saúde bucal.
- () Doença periodontal tem sido associada a outras alterações sistêmicas como diabetes mellitus, aterosclerose subclínica e síndrome coronariana aguda.
- () O fator mais comumente associado ao câncer de boca é a má higiene oral.
- () O câncer de boca é uma neoplasia maligna de fácil detecção, tratamento e controle.

- A. () V, V, V, F, F.
- B. () V, V, V, F, V.
- C. () F, V, V, F, V.
- D. () F, F, V, V, V.

40ª QUESTÃO – Marque a alternativa CORRETA:

- A. () As técnicas de análise descritiva podem ser divididas em estatísticas e inferenciais.
- B. () Num estudo de coortes, as medidas utilizadas para estudar a magnitude do efeito incluem o risco atribuível (RA) e o risco absoluto (RAbs).
- C. () Em estudos de caso-controle a medida de magnitude (do efeito) utilizada é a *odds ratio* (OR), também conhecida como razão de produtos não cruzados.
- D. () Num estudo transversal, a análise reside nas prevalências estimadas. Assim, essas medidas incluem a diferença de prevalências e a razão de prevalências.

----- corte aqui-----
RASCUNHO – GABARITO DO CANDIDATO

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40