

GABARITO – RESIDÊNCIA MÉDICA / 2009

1ª QUESTÃO	A	B	C	D
2ª QUESTÃO	A	B	C	D
3ª QUESTÃO	A	B	C	D
4ª QUESTÃO	A	B	C	D
5ª QUESTÃO	A	B	C	D
6ª QUESTÃO	A	B	C	D
7ª QUESTÃO	A	B	C	D
8ª QUESTÃO	A	B	C	D
9ª QUESTÃO	A	B	C	D
10ª QUESTÃO	A	B	C	D
11ª QUESTÃO	A	B	C	D
12ª QUESTÃO	A	B	C	D
13ª QUESTÃO	A	B	C	D
14ª QUESTÃO	A	B	C	D
15ª QUESTÃO	A	B	C	D
16ª QUESTÃO	A	B	C	D
17ª QUESTÃO	A	B	C	D
18ª QUESTÃO	A	B	C	D
19ª QUESTÃO	A	B	C	D
20ª QUESTÃO	A	B	C	D

21ª QUESTÃO	A	B	C	D
22ª QUESTÃO	A	B	C	D
23ª QUESTÃO	A	B	C	D
24ª QUESTÃO	A	B	C	D
25ª QUESTÃO	A	B	C	D
26ª QUESTÃO	A	B	C	D
27ª QUESTÃO	A	B	C	D
28ª QUESTÃO	A	B	C	D
29ª QUESTÃO	A	B	C	D
30ª QUESTÃO	A	B	C	D
31ª QUESTÃO	A	B	C	D
32ª QUESTÃO	A	B	C	D
33ª QUESTÃO	A	B	C	D
34ª QUESTÃO	A	B	C	D
35ª QUESTÃO	A	B	C	D
36ª QUESTÃO	A	B	C	D
37ª QUESTÃO	A	B	C	D
38ª QUESTÃO	A	B	C	D
39ª QUESTÃO	A	B	C	D
40ª QUESTÃO	A	B	C	D



**PROCESSO DE SELEÇÃO PÚBLICA PARA ADMISSÃO
AOS PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DA
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS PARA O ANO DE 2009.**

RESIDÊNCIA MÉDICA

Edital DRH/CRS nº 14, de 21/outubro/2008

*OBSTETRÍCIA E GINECOLOGIA, CLÍNICA MÉDICA, CIRURGIA GERAL,
PEDIATRIA E MEDICINA PREVENTIVA E SOCIAL*

NOME: _____ **Nº IDENTIDADE:** _____

LOCAL DE PROVA: _____ **SALA:** _____

INSTRUÇÕES AOS CANDIDATOS:

1. Abra este caderno de prova somente quando autorizado.
2. Esta prova contém 40 (quarenta) questões valendo 2,25 (dois vírgula vinte e cinco) pontos cada, totalizando 90 (noventa) pontos.
3. Responda as questões e marque a opção desejada na folha de respostas, usando caneta (tinta azul ou preta).
4. Para cada questão existe somente uma resposta.
5. A prova terá duração de 180 (cento e oitenta) minutos, incluindo o preenchimento da folha de respostas.
6. Prova sem consulta.
7. Não será admitido nenhum tipo de rasura na folha de respostas. As questões rasuradas ou em branco ou com dupla marcação serão consideradas nulas para o candidato.
8. É proibido o porte e o uso de máquinas calculadoras, telefones celulares ou outros similares.
9. Ao final da prova entregue ao aplicador a folha de respostas, devidamente preenchida, assinada e conferida.

**PROVA DE SELEÇÃO PÚBLICA AO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA
MÉDICA DO HPM- 2009**

OBSTETRÍCIA E GINECOLOGIA

1ª QUESTÃO - Marque a alternativa **CORRETA**. O desenvolvimento do câncer de colo uterino é associado com:

- A. () **infecção pelo papiloma vírus humano (HPV).**
- B. () infecção por clamídia.
- C. () infecção por cândida.
- D. () infecção por herpes vírus.

2ª QUESTÃO - Marque a alternativa **CORRETA**. É um hormônio frequentemente solicitado para o diagnóstico de menopausa:

- A. () TSH.
- B. () **FSH.**
- C. () Progesterona.
- D. () Prolactina.

3ª QUESTÃO - Marque a alternativa **CORRETA**. Constitui terapêutica das displasias cervicais uterinas:

- A. () **conização.**
- B. () colposcopia.
- C. () exame especular.
- D. () teste de Schiller.

4ª QUESTÃO - Marque a alternativa **CORRETA**. Qual das síndromes é mais comum em bebês nascidos vivos?

- A. () trissomia do 13.
- B. () trissomia do 18.
- C. () **trissomia do 21.**
- D. () monossomia X (síndrome de Turner).

5ª QUESTÃO - Marque a alternativa **CORRETA**. A diminuição da motilidade gástrica durante a gravidez é devida a níveis aumentados de:

- A. () prolactina.
- B. () estrogênio.
- C. () androstenediona.
- D. () **progesterona.**

**PROVA DE SELEÇÃO PÚBLICA AO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA
MÉDICA DO HPM- 2009**

6ª QUESTÃO - Marque a alternativa **CORRETA**. A anemia mais comum da gravidez é devida a:

- A. () deficiência de ácido fólico.
- B. () talassemia.
- C. () **deficiência de ferro.**
- D. () deficiência de B 12.

7ª QUESTÃO - Marque a alternativa **CORRETA**. Qual dessas condições é característica da eclâmpsia e não da pré- eclâmpsia?

- A. () proteinúria.
- B. () edema.
- C. () **convulsões.**
- D. () hipertensão arterial.

8ª QUESTÃO - Marque a alternativa **CORRETA**. Qual das condições não está comumente associada a endometriose?

- A. () dor pélvica.
- B. () **incontinência urinária.**
- C. () infertilidade.
- D. () dismenorréia (menstruação dolorosa).

CLÍNICA MÉDICA

9ª QUESTÃO - Marque a alternativa **CORRETA**:

- A. () **níveis séricos elevados de creatinina e uréia não causam, por si, vários sinais e sintomas da síndrome urêmica.**
- B. () surto de tosse aguda é mais frequentemente causado por infecção respiratória baixa.
- C. () a doença de Osler-Rendu-Weber, teleangiectasia hemorrágica hereditária, afeta exclusivamente o trato digestivo.
- D. () hipertensão arterial é importante fator de risco para acidente vascular encefálico hemorrágico, não influenciando o tipo isquêmico.

10ª QUESTÃO - Marque a alternativa **INCORRETA**:

PROVA DE SELEÇÃO PÚBLICA AO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA
MÉDICA DO HPM- 2009

- A. () remodelamento ventricular se refere às mudanças na massa, volume, forma e composição do ventrículo esquerdo que acontece após injúria cardíaca e/ou condições hemodinâmicas anormais.
- B. () um fator predisponente para bacteriúria em homens é obstrução uretral secundária a hipertrofia prostática.
- C. () **necrose de hepatócitos é a condição que libera as aminotransferases para o sangue e há boa correlação do nível sérico com o grau de lesão hepática.**
- D. () bactérias anaeróbias tem papel importante em pneumonias somente quando episódio de aspiração ocorre dias a semanas anteriores ao início da doença.

11ª QUESTÃO - Com relação à dor abdominal, marque a alternativa **INCORRETA**:

- A. () dor que acorda o paciente do seu sono deve ser considerada significante.
- B. () dor súbita e intensa sugere doença séria, porém doenças sérias podem ocorrer na ausência de início súbito.
- C. () episódios repetidos da mesma dor geralmente sugerem uma causa com tratamento clínico, com raras exceções, como isquemia mesentérica e colecistite.
- D. () **regra geral: vômito quase sempre precede a dor em causas com tratamento cirúrgico.**

12ª QUESTÃO - Em relação à HAS marque a alternativa **INCORRETA**.

- A. () Débito cardíaco e resistência arterial periférica são variáveis determinantes na pressão arterial.
- B. () **A associação mais efetiva ao bloqueador de canal de cálcio é o diurético.**
- C. () O controle rigoroso da pressão arterial pode reverter a hipertrofia do ventrículo esquerdo.
- D. () Pacientes com idade acima de 50 anos respondem melhor ao tratamento medicamentoso com diuréticos ou bloqueador de canal de cálcio.

13ª QUESTÃO - Veja se as frases estão corretas ou incorretas e escolha a alternativa adequada:

**PROVA DE SELEÇÃO PÚBLICA AO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA
MÉDICA DO HPM- 2009**

- A causa mais comum de insuficiência renal aguda é a pré-renal que ocorre quando há hipoperfusão renal;
- Respiração de Cheyne Stokes é comum na insuficiência cardíaca avançada e é usualmente associada a baixo débito cardíaco;
- Albumina sérica é sintetizada exclusivamente pelos hepatócitos;
- Doença cardíaca a principal causa de óbito em pacientes hipertensos;
- Importante perda de peso que é desproporcional ao grau de disfagia é altamente sugestiva de carcinoma de esôfago;
- Acredita-se que a dor na pericardite é originada pela inflamação da pleura parietal adjacente, já que a maior parte do pericárdio é insensível à dor ;
- O PSA (antígeno prostático específico) é produzido por epitélio maligno bem como pelo sadio, portanto é próstata/específico e não câncer/específico, podendo ter nível sérico elevado na prostatite, hipertrofia prostática benigna e no câncer prostático;
- Espasmo esofágico pode ocorrer na presença ou ausência de refluxo ácido e origina dor opressiva indistinguível da angina pectoris.

- A. () uma frase é incorreta e as demais corretas.
B. () duas frases são incorretas e as demais corretas.
C. () todas estão corretas.
D. () três frases são incorretas e as demais corretas.

14ª QUESTÃO - Na ausência de anticorpos anti-DNA nativo, o marcador sorológico mais fiel (específico) para o diagnóstico do Lúpus Eritematoso Sistêmico é o anticorpo:

- A. () anti-RNP.
B. () anti-Sm.
C. () anti-histona.
D. () anti-DNA histona.

15ª QUESTÃO - Num paciente com cirrose de qualquer natureza com presença de ascite e varizes esofagianas, a presença de febre e dor abdominal difusa deve levantar a suspeita de:

**PROVA DE SELEÇÃO PÚBLICA AO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA
MÉDICA DO HPM- 2009**

- A. () colecistite aguda.
- B. () doença vascular mesentérica.
- C. () doença inflamatória do cólon.
- D. () **peritonite bacteriana espontânea.**

16ª QUESTÃO - A confirmação diagnóstica da gota é feita quando há:

- A. () hiperuricemia.
- B. () lesões em sacabocados justarticulares.
- C. () neutrofilia com linfopenia no líquido sinovial.
- D. () **cristais de birrefringência negativa forte intra-leucocitários no líquido sinovial.**

CIRURGIA GERAL

17ª QUESTÃO - Assinale a alternativa correta em relação ao carcinoma broncogênico:

- A. () o carcinoma de pequenas células é pouco agressivo e raramente tem tendência de se metastatizar.
- B. () o carcinoma broncoalveolar é um subtipo especial do carcinoma epidermóide.
- C. () **o carcinoma de células escamosas geralmente começa como uma lesão central e tende a dar metástases mais tardiamente do que o adenocarcinoma.**
- D. () o carcinoma de células escamosas é o tipo histológico mais freqüente.

18ª QUESTÃO - Paciente apresenta um nódulo pulmonar solitário. Considerando a propedêutica deste nódulo, marque a opção **CORRETA**:

- A. () se a idade do paciente for maior que 50 anos, 10% dos nódulos são malignos.
- B. () **uma etiologia benigna é sugerida na lesão que permanece inalterada por mais de dois anos, documentada em exames radiológicos seriados.**
- C. () a citologia de escarro freqüentemente é diagnóstica nesta situação.
- D. () a sensibilidade da aspiração por agulha fina transtorácica é muito baixa, cerca de 10%.

19ª QUESTÃO - A síndrome de Lynch (HNPCC) é caracterizada pela mutação nos genes:

- A. () APC

**PROVA DE SELEÇÃO PÚBLICA AO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA
MÉDICA DO HPM- 2009**

- B. () DCC
- C. () MMR
- D. () TP53

20ª QUESTÃO - Em relação à fissura anal assinale a alternativa correta.

- A. () É causa mais freqüente de hematoquezia nas crianças.
- B. () Localiza-se preferencialmente na linha média anterior.
- C. () O tratamento clínico das fissuras com cremes a base de nitroglicerina ou derivados produzem taxas de curas inferiores a 20% e devem ser desestimulados.
- D. () O tratamento cirúrgico é reservado aos casos refratários ao tratamento clínico e consiste na esfínterectomia interna parcial posterior.

21ª QUESTÃO - A oclusão da drenagem venosa supra-hepática pode resultar em hipertrofia e maior captação de contraste à TC de qual segmento:

- A. () segmento IV
- B. () segmento V
- C. () segmento I
- D. () segmento VIII

22ª QUESTÃO - Quanto ao uso do TIPS, é **CORRETO**:

- A. () Não se indica o TIPS na proximidade do transplante hepático.
- B. () A contra-indicação clássica é a descompensação hepática funcional avançada.
- C. () Seu maior benefício é a insuficiência cardíaca direita e doença hepática policística.
- D. () É criado um trajeto intra- parenquimatoso entre veia supra hepática e a porta.

23ª QUESTÃO - O adenoCa gástrico envolvendo até a serosa, com acometimento em 02 linfonodos e ausência de metástases à distância, se classifica corretamente como:

- A. () estágio IIIb
- B. () estágio IIIa
- C. () estágio II

**PROVA DE SELEÇÃO PÚBLICA AO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA
MÉDICA DO HPM- 2009**

D. () estágio IV

24ª QUESTÃO - Sobre a infecção na ferida operatória, é **INCORRETO**:

- A. () O uso excessivo do cautério, a idade avançada, o aumento do tempo operatório são fatores de risco para infecção da ferida cirúrgica.
- B. () A presença de crepitação na ferida operatória pode representar emergência cirúrgica.
- C. () Em feridas classificadas como contaminadas, o uso de antibiótico não deve ter apenas caráter profilático.
- D. () **A ferida classificada como contaminada tem índice de infecção do sítio operatório maior que 80%.**

PEDIATRIA

25ª QUESTÃO - Criança de 3 anos apresenta febre alta, de início súbito e progressivo, voz abafada, toxemia e dispnéia que melhora na posição sentado.

O diagnóstico mais provável é:

- A. () laringite estridulosa.
- B. () **epiglote.**
- C. () laringotroqueomalácia.
- D. () traqueobronquite.

26ª QUESTÃO - Qual sequência é encontrada no desenvolvimento normal da maturação sexual feminina de uma adolescente:

- A. () menarca, telarca, pubarca.
- B. () pubarca, telarca, menarca.
- C. () **telarca, pubarca, menarca.**
- D. () menarca, pubarca, telarca.

27ª QUESTÃO - Um menino de 07 anos é atendimento no Pronto-Socorro com quadro de tosse e febre há 02 dias. Há 01 dia está cansado e vomitando após tosse. A radiografia de tórax revela opacificação do lobo inferior direito e linha de derrame pleural. Este quadro sugere:

- A. () **pneumonia por pneumococo.**
- B. () pneumonia por gram-negativo.

**PROVA DE SELEÇÃO PÚBLICA AO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA
MÉDICA DO HPM- 2009**

- C. () pneumonia por estafilococa.
- D. () pneumonia por aspiração.

28ª QUESTÃO - Em relação a ITU na infância é **CORRETO** afirmar:

- A. () Completado o tratamento de ITU e após a investigação de possíveis alterações no trato urinário a criança deve ser mantida em quimioprofilaxia.
- B. () O tratamento da ITU no recém-nascido deve ser feito por via oral
- C. () **A investigação do trato urinário por imagens está indicada após o primeiro episódio bem documentado de infecção urinária em qualquer idade e para ambos os gêneros.**
- D. () As quinolonas são amplamente utilizadas no tratamento de ITU na infância.

29ª QUESTÃO – Sobre as glomerulonefrites na infância, é **CORRETO** afirmar:

- A. () A maioria é uma agudização de uma glomerulonefrite de evolução crônica, não identificada anteriormente.
- B. () **São caracterizadas pelo aparecimento de edema, oligúria, hipertensão arterial, hematúria com cilindros hemáticos e, algumas vezes, graus variados de insuficiência renal.**
- C. () A glomerulonefrite difusa aguda pós-estreptocócica é mais freqüente abaixo de 02 anos de idade.
- D. () A glomerulonefrite difusa aguda pós-estreptocócica, geralmente é uma doença auto-limitada e a maioria das manifestações clínicas desaparece entre quatro a seis semanas a partir do seu início.

30ª QUESTÃO - Na criança com varicela:

- A. () O período prodômico dura 4-5 dias e sempre ocorre.
- B. () As lesões têm caráter recorrente.
- C. () A consistência das lesões é endurecida
- D. () **A distribuição do exantema é centrípeta.**

31ª QUESTÃO - Com relação a obesidade na infância é **CORRETO** afirmar:

- A. () **A obesidade do grupo exógeno geralmente é acompanhada de altura acima da média.**
- B. () A obesidade na infância e adolescência não tem relação com obesidade na idade adulta.
- C. () A maioria dos casos apresenta uma causa endócrina ou genética

**PROVA DE SELEÇÃO PÚBLICA AO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA
MÉDICA DO HPM- 2009**

- D. () No Brasil estima-se que a maioria dos adolescentes apresentem, com base no índice de massa corporal, algum grau de obesidade.

32ª QUESTÃO - Pela escala de Denver é esperado que uma criança:

- A. () Imite sons de fala por volta dos 02 meses.
B. () **A criança fique sentada sem suporte entre 5 e 7 meses.**
C. () Fala dada ou mamã, específicos, entre 4 e 5 meses.
D. () Copie um quadrado com 02 anos.

MEDICINA PREVENTIVA E SOCIAL

33ª QUESTÃO - Assinale a afirmativa que representa uma característica de doença crônica não transmissível:

- A. () **interação com fatores etiológicos desconhecidos.**
B. () longo curso sintomático.
C. () lesões celulares reversíveis.
D. () curtos períodos de latência.

34ª QUESTÃO - Das afirmativas abaixo, qual **NÃO É** função da Vigilância Epidemiológica?

- A. () coleta de dados.
B. () recomendação de medidas de controles apropriadas.
C. () promoção das ações de controle indicadas.
D. () **tratamento das doenças endêmicas.**

35ª QUESTÃO - O Seguro de Acidente do Trabalho é um benefício que é pago em todas as condições que ocorrer:

- A. () acidente de trânsito.
B. () **incapacidade para o trabalho.**
C. () morte por acidente.
D. () doenças crônico degenerativas.

36ª QUESTÃO - A capacidade de um procedimento de diagnose de efetuar diagnósticos corretos da ausência de doenças quando esta está ausente é definida como?

- A. () positividade.
B. () negatividade.
C. () **especificidade.**
D. () sensibilidade.

PROVA DE SELEÇÃO PÚBLICA AO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA
MÉDICA DO HPM- 2009

37ª QUESTÃO - O coeficiente de mortalidade infantil determina o risco de morte para crianças até qual idade?

- A. () até a idade pré-escolar.
- B. () **menor que 1 ano.**
- C. () menores que 6 meses.
- D. () menores que 3 meses.

38ª QUESTÃO - Assinale a afirmativa que corresponde à atenção terciária

- A. () evitar seqüelas.
- B. () proteção específica.
- C. () aconselhamento genético.
- D. () **emprego para reabilitado.**

39ª QUESTÃO - O maior ou menor poder que tem uma doença em provocar a morte das pessoas que adoeceram por uma doença é definido como:

- A. () índice de mortalidade.
- B. () **coeficiente de letalidade.**
- C. () morbidade.
- D. () coeficiente de mortalidade.

40ª QUESTÃO - Assinale a doença que ocorre pelo mecanismo de transmissão indireta:

- A. () **chagas.**
- B. () tuberculose.
- C. () hanseníase.
- D. () sarampo.